

(19)



**Евразийское
патентное
ведомство**

(11) **034175**(13) **B1**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(45) Дата публикации и выдачи патента
2020.01.14

(51) Int. Cl. **C12N 9/42 (2006.01)**

(21) Номер заявки
201401199

(22) Дата подачи заявки
2013.04.30

(54) БЕЛОК, ИМЕЮЩИЙ ЭНДОГЛЮКАНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ, И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОСАХАРИВАНИЯ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

(31) **12166458.5**

(32) **2012.05.02**

(33) **EP**

(43) **2015.08.31**

(86) **PCT/EP2013/058985**

(87) **WO 2013/164340 2013.11.07**

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
**КЛАРИАНТ ПРОДУКТЕ
(ДОЙЧЛАНД) ГМБХ (DE)**

(72) Изобретатель:
**Райзингер Кристоф, Кларен Йорг,
Унтерштрассер Изабель (DE),
Митрович Александра (AT), Фликер
Карлхайнц, Гебхард Габи (DE)**

(74) Представитель:
**Саломатина И.С., Фелицына С.Б.
(RU)**

(56) **WO-A2-2012036810**

WO-A2-2011153516

WO-A2-2007115723

ZHU Y.S. ET AL.: "Induction and regulation of cellulase synthesis in Trichoderma pseudokoningii mutants EA3-867 and N2-78", ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, STONEHAM, MA, US, vol. 4, no. 1, 1 January 1982 (1982-01-01), pages 3-12, XP023678002, ISSN: 0141-0229, DOI:10.1016/0141-0229(82)90003-5 [retrieved on 1982-01-01], abstract

ERIKSSON T. ET AL.: "A model explaining declining rate in hydrolysis of lignocellulose substrates with cellobiohydrolase I (Cel7A) and Endoglucanase I (Cel7B) of Trichoderma reesei", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, HUMANA PRESS, INC, UNITED STATES, vol. 101, no. 1, 1 April 2002 (2002-04-01), pages 41-60, XP008103337, ISSN: 0273-2289, DOI:10.1385/ABAB:101:l:41 [retrieved on 2007-06-01], abstract

(57) Изобретение относится к белку, имеющему эндогликоканазную активность, который демонстрирует по меньшей мере 90%-ную остаточную способность к превращению субстрата при его инкубации в течение 1 ч при температуре 60°C. Заявленный белок может быть использован для осахаривания лигноцеллюлозы. Изобретение также относится к нуклеиновой кислоте, кодирующей заявленный белок, вектору, содержащему заявленную нуклеиновую кислоту, и микроорганизму, содержащему заявленный вектор. Изобретение также относится к композиции для осахаривания лигноцеллюлозы, содержащей заявленный белок и один или несколько ферментов, выбранных из целлюлаз, гемицеллюлаз и пектиназ.

B1**034175****034175****B1**

Область изобретения и предшествующий уровень техники

Целлюлоза является основным компонентом растительного материала. Она является основой структурной целостности растений и часто встречается в лигноцеллюлозном матриксе, состоящем из целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина. Области применения с использованием целлюлозы используют преимущества или ее структурные свойства (волокна, текстиль, бумага и т.п.) либо ее углеводную природу для получения D-глюкозы, целлобиозы и/или олигомеров целлюлозы.

Лигноцеллюлозы легкодоступны из (продуктов) сельского и лесного хозяйства, включают потоки побочных продуктов (переработки) зерновых, кукурузы, сахарного тростника, сахарной свеклы, древесины и т.п. В ближайшем будущем растения с оптимизированным содержанием лигноцеллюлозы и урожайностью ("энергетические культуры"), по-видимому, будут вносить вклад в качестве важного ресурса.

Целлюлазы содержат структурно и функционально разнообразный класс гликогидролаз, действующих на целлюлозу. Целлюлазы обнаружены в бактериях, археях, грибах и растениях. В целом, обладая активностью гидролитического расщепления гликозидных связей, присутствующих в полимерах целлюлозы или олигомерах, они (целлюлазы) различаются по субстратной специфичности, механизму действия и ферментативным параметрам, включающим процессивность, температурный и pH оптимум. Большинство целлюлаз действуют на β -1,4-связи между двумя остатками глюкозы. Однако другие связи, обнаруженные в лигноцеллюлозах, также могут быть гидролизованы. По механизму их действия целлюлазы могут быть подразделены на эндо- и экзоферменты. Эндоглюканазы расщепляют полимер целлюлозы в случайных местах, посредством чего снижая степень полимеризации. Экзоферменты, такие как целлобиогидролазы, работают в последовательном механизме действия, высвобождая целлобиозу (D-глюкозо- β -1,4-D-глюкопиранозид) из редуцирующего или нередуцирующего конца полимера.

База данных CAZY [Cantarel B.L., Coutinho P.M., Rancurel C., Bernard T., Lombard V., Henrissat B. (2009) The Carbohydrate-Active EnZymes database (CAZY): an expert, resource for Glycogenomics. *Nucleic Acids Res* 37:D233-238 PMID: 18838391] содержит, среди прочих, коллекцию известных гликогидролаз, включающих ферменты, разрушающие целлюлозу, (т.е. целлюлазы). В этой базе данных ферменты классифицированы в различные GH-классы (гликозилгидролаз (GH)) согласно структурным элементам. Некоторые GH-классы включают эндоглюканазы, в частности классы GH5, GH7, GH9, GH12, GH16, GH45, GH48, GH61 и GH74. Несмотря на большое разнообразие внутри некоторых GH-классов, члены одного GH-класса часто имеют сходные физические и ферментативные параметры. Это позволяет сделать общие утверждения для членов определенного GH-класса, такие как субстратная специфичность, диапазон pH, стабильность или каталитическая эффективность.

Микроорганизмы, разрушающие целлюлозу, часто производят и секретируют сложную смесь целлюлаз. Например, в секретоме *Trichoderma reesei* (во всех белках, секретируемых *Trichoderma reesei*) было идентифицировано 7 эндоглюканаз, принадлежащих к 6 различным GH-классам (Cel5A, Cel7B, Cel12A, Cel45A, Cel61A, Cel61B, Cel74A). Различные эндоглюканазы демонстрируют спектр свойств (Karlsson J., Siika-aho M., Tenkanen M., Tjerneld F. Enzymatic properties of the low molecular mass endoglucanases Cel12A (EG III) and Cel45A (EG V) of *Trichoderma reesei*. *J Biotechnol.* 2002 Oct 9;99(1):63-78. PubMed PMID: 12; Karlsson J., Momcilovic D., Wittgren B., Schulein M., Tjerneld F., Brinkmalm G. Enzymatic degradation of carboxymethyl cellulose hydrolyzed by the endoglucanases Cel5A, Cel7B, and Cel45A from *Humicola insolens* and Cel7B, Cel12A and Cel45A core from *Trichoderma reesei*. *Biopolymers.* 2002 Jan; 63(1):32-40. PubMed PMID:11754346). Считается, что две преобладающих эндоглюканазы, EGI (Cel7B, GH7) и EGII (Cel5A) являются наиболее активными их ферментами.

Синергическая активность целлюлолитических ферментов обеспечивает эффективное разрушение сложных субстратов (B. Henrissat, H. Driguez, C. Viet & M. Schulein: Synergism of Cellulases from *Trichoderma reesei* in the Degradation of Cellulose; *Nature Biotechnology* 3, 722-726 (1985) doi:10.1038/nbt0885-722) и исключает замену компонента одного структурного класса ферментом из другого класса, тогда как, в то же самое время, гидролитическую эффективность необходимо поддерживать на максимальном уровне (неэквивалентность различных эндоглюканаз (EGs)). Простая замена другим классом ферментов GH не всегда возможна. В общем, члены эндоглюканаз семейства GH5 (включающие EGs термофильных бактерий) демонстрируют более высокую термостабильность по сравнению с эндоглюканазами семейства GH7; тем не менее, применение термостабильного белка семейства GH7 часто является выгодным для высоких скоростей гидролиза.

Сообщалось о многих применениях эндоглюканаз как в виде части сложных композиций ферментов, так и отдельных ферментативных активностей. Целлюлазы являются важными для производства биологических видов топлива, полученных из целлюлозы. После резки и, возможно, химической и/или физической предварительной обработки лигноцеллюлозы инкубируют с целлюлазами для высвобождения мономеров сахаров, которые дополнительно подвергают обработке. Режимы обработки должны быть адаптированы для оптимизации скоростей гидролиза, выходов продукта и/или стабильности. Более высокие температуры часто являются предпочтительными в этих способах, но требуются более термостабильные ферменты. Способы одновременного осахаривания и гидролиза (ферментации) (SSF) требуют целлюлолитических ферментов, которые являются активными в условиях ферментации. Консолидиро-

ванная биообработка сырья (СВР) дополнительно требует объединения свойств ферментов для выполнения в одну стадию получения фермента, осахаривания и ферментации.

Другие применения эндоглюканаз нацелены только на частичный гидролиз или модификацию целлюлозных волокон (модификацию волокна, биополировку, биологическое состаривание и т.д.). Следовательно, применяемые эндоглюканазы должны работать и/или быть стабильными при повышенных температурах, экстремальных значениях pH (например, щелочных, кислых) и химических условиях (например, прачечной, (в виде) детергентов, протеаз, растворителей и т.д.). Повреждение волокон должно быть сведено к минимуму для таких применений. Эндоглюканазы также могут помогать в отделении нецеллюлозных фракций от волоконного материала в способах варки (производство пульпы и бумаги) или улучшать реологические свойства технологических потоков. Устойчивость к детергентам и устойчивость к протеазам может быть рассмотрена в виде продукта с повышенной стабильностью структуры фермента, свойство, которое также является связанным с повышенной термостабильностью. Эндоглюканазы также находят применения в производстве пищевых продуктов и кормов (в пивоварнях, виноделии, извлечении масла из жмыха, выпечке, получении теста). Часто стерилизация или пастеризация требует более высоких температур. Для сокращения времени обработки может быть выгодной технологическая стабильность эндоглюканаз.

Белки эндоглюканазы I (Cel7B), полученные из грибов рода *Trichoderma* (анаморфа *Neurospora*), демонстрируют высокую степень идентичности и считаются мезофильными. Сообщается, что наиболее стабильные эндоглюканазы члены семейства GH7 являются нативными ферментами из *Humicola insolens* (Cel7B) и *Fusarium oxysporum* (egl) (US5912157). Согласно указанному сообщению EGI не обнаруживает активность (при температуре) выше 60°C. Таким образом, существует необходимость в области обеспечения более термостабильных эндоглюканаз из семейства GH7.

Сообщалось, что некоторые эндоглюканазы могут быть термоинактивированы при более высоких температурах (Dominguez J.M., Acebal C., Jimenez J., de la Mata I., Macarron R., Castillon M.P. Mechanisms of thermoinactivation of endoglucanase I from *Trichoderma reesei* QM 9414. *Biochem J.* 1992 Oct 15; 287 (Pt 2): 583-8). Авторы указанного исследования также пытались повторно активировать термоинактивированную эндоглюканазу, но это требовало жестких условий, с использованием 8 М мочевины и дополнительных агентов. Эффекты, описанные в виде продуктивной повторной укладки (рефолдинга), были показаны на других белках, кроме эндоглюканаз [Zhang N., Suen W.C., Windsor W., Xiao L., Madison V., Zaks A. Improving tolerance of *Candida antarctica* lipase B towards irreversible thermal inactivation through directed evolution. *Protein Eng.* 2003 Aug; 6(8):599-605], но по знаниям авторов изобретения, не для эндоглюканаз, в частности эндоглюканаз GH7. В данной области считается, что термоинактивированные эндоглюканазы являются малопригодными в промышленном разложении целлюлозы. С другой стороны, повышенная термостабильность часто является необходимой для эндоглюканаз, в частности для ферментов грибкового происхождения. До настоящего времени сообщалось только о некоторых улучшениях для эндоглюканаз GH12 и GH45. Сообщалось о термостабильных эндоглюканазах со структурными укладками цепей из GH5 и GH48. Указанные эндоглюканазы в отношении их кинетических свойств и предпочтении к субстрату, по существу, отличаются от эндоглюканаз GH7-класса.

Таким образом, существует необходимость в процессивных эндоглюканазах, конкретно семейства GH7, с более высокими температурными профилями. Более того, было бы желательным достижение хорошей продуктивности от их экспрессирующего хозяина. Необходимость дополнительно подкрепляется фактом, что многие процессы промышленного значения протекают в жестких условиях и при повышенных температурах. Проблема, подлежащая решению настоящим изобретением, состоит в обеспечении улучшенных эндоглюканаз, конкретно эндоглюканаз с улучшенными термическими свойствами. Дополнительные проблемы, рассматриваемые и решаемые настоящим изобретением, станут очевидными из приведенных ниже разделов

Изложение сущности изобретения

Первый аспект настоящего изобретения предусматривает белок, имеющий эндоглюканазную активность, который содержит аминокислотную последовательность, идентичную по меньшей мере на 96% последовательности SEQ ID NO: 2, включающий по меньшей мере одну мутацию, выбранную из замен, показанных в табл. 2-4, который демонстрирует по меньшей мере 90%-ную остаточную способность к превращению субстрата при его инкубации в течение 1 ч при температуре 60°C.

Согласно одному варианту осуществления изобретения заявленный белок содержит аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 97%, предпочтительно по меньшей мере 98%, более предпочтительно по меньшей мере 99%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 99,5% идентичность с последовательностью SEQ ID NO: 2.

Согласно другому варианту осуществления изобретения заявленный белок имеет последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 12.

Согласно другому варианту осуществления изобретения заявленная по меньшей мере одна мутация является мутацией, выбранной из предпочтительных, более предпочтительных или альтернативных замен, показанных в табл. 3.

Согласно другому варианту осуществления изобретения заявленная по меньшей мере одна мутация является мутацией, выбранной из предпочтительных, более предпочтительных или альтернативных замещений, показанных в табл. 4.

Второй аспект настоящего изобретения предусматривает нуклеиновую кислоту, кодирующую заявленный белок.

Третий аспект настоящего изобретения предусматривает вектор, содержащий заявленную нуклеиновую кислоту.

Четвертый аспект настоящего изобретения предусматривает микроорганизм, содержащий заявленный вектор.

Пятый аспект настоящего изобретения предусматривает композицию для осахаривания лигноцеллюлозы, содержащую заявленный белок и один или несколько ферментов, выбранных из целлюлаз, гемицеллюлаз и пектиназ.

Шестой аспект настоящего изобретения предусматривает применение заявленного белка для осахаривания лигноцеллюлозы.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - SDS-гель демонстрирует экспрессию последовательности SEQ ID NO: 8 вариантного белка SEQ ID NO: 2, секретируемого в супернатант. Полоса экспрессируемого белка видна между 75 и 100 кДа.

Фиг. 2 - экспрессирующая плазмида *Trichoderma reesei*. Последовательность ДНК, кодирующая зрелый ген эндоглюканазы, клонируют в слиянии с сигнальной пептидной последовательностью TrCBHI под контролем промотора TrCBHI. Подлежащая вырезанию (эксцизии) экспрессирующая кассета SwaI/SbfI содержит кассету устойчивости к гигромицину для селекции трансформантов.

Фиг. 3 - варианты эндоглюканазы, демонстрирующие повышенную температурную стабильность ([6] и [3]), и варианты с повышенной температурной стабильностью и активной термостабилизацией [1], [4], [5], [7]-[10] в сравнении с нативным белком GH7 [2].

Фиг. 4 - калибровка частей по 200 мкл раствора щелочного 4-метилумбеллиферона для считывания флуоресценции в планшетном ридере Tecan Infinite 200. Раствор 10 мМ готовили растворением 440 мг 4-метилумбеллиферона (Sigma Aldrich, № в каталоге 69580) в 250 мл 0,5 М раствора углекислого натрия. Серийные разведения готовили в 0,5 М углекислом натрии. Интенсивность флуоресценции измеряли при 360/454 нм с усилением 50.

Фиг. 5 - термостабилизация SEQ ID NO: 13 по сравнению с SEQ ID NO: 4.

Фиг. 6 - определение периода полураспада при 70°C (пример 7) для SEQ ID NO: 14 по сравнению с SEQ ID NO: 4.

Определения

"Термостабильность" является термином, используемым для описания внутреннего свойства конкретного белка с эндоглюканазной активностью по изобретению.

"Активная термостабилизация" является термином, используемым для описания внутреннего свойства конкретного белка с эндоглюканазной активностью по изобретению.

Определение термостабильности и/или активной термостабилизации.

Термостабильность и активную термостабилизацию определяют следующим образом.

1. Фермент экспрессируется в *Pichia pastoris*, как описано в примере 2. Если требуется, фермент очищают.

2. Корректировка концентрации фермента.

Раствор фермента подходящей концентрации делают путем разведения очищенного фермента или культурального супернатанта *Pichia pastoris* в натрий-ацетатном буфере (50 мМ, pH 5) для применимой рабочей концентрации. Для определения применимой рабочей концентрации серийное разведение фермента, полученного на стадии 1 выше, готовят в натрий-ацетатном буфере, и аликвоты 10 мкл тестируют в температурном градиенте, как описано в примере 4. Применимую рабочую концентрацию определяют в виде концентрации, которая в результате дает сигнал флуоресценции между 5000 и 15000 в планшетном ридере Tecan Infinite M200 с усилением 50, или эквивалентной концентрации от 5,4 до 19 мкМ 4-метилумбеллиферона после инкубации, как описано в примере 4.

3. Определение способности к превращению субстрата, как описано в примере 4, за исключением того, что аликвоту 10 мкл культурального супернатанта заменяют на аликвоту 10 мкл раствора фермента в применимой рабочей концентрации, как определено на стадии 2.

4. Нормализация измерения путем деления всех считываний относительных единиц флуоресценции (rfu) на максимальное считывание (значение) rfu в пределах градиента температуры для получения относительного превращения субстрата для каждого тестируемого белка при каждой протестированной температуре.

5. Графическое изображение относительного превращения субстрата в зависимости от протестированных температур реакции.

6. Определение температурной стабильности, как описано в (a), или определение активной термостабилизации, как описано в (b), являются следующими.

a. Определение температурной стабильности: белок отличается температурной стабильностью, если

относительное превращение субстрата при 60°C составляет 0,5 или более, предпочтительно 0,7 или более и более предпочтительно 0,9 или более, например 0,95 или более.

Определение активной термостабилизации: анализ графика, полученного на стадии 5) на присутствие плато при относительном превращении субстрата, которое находится ниже максимального уровня (который составляет 1), но которое находится по меньшей мере вплоть до 0,15.

Плато определяют в виде уровня относительного превращения субстрата, который является, по существу, неизменным в диапазоне температур по меньшей мере 5°C, предпочтительно от 70 до 75°C (т.е. в пределах $\pm 0,1$ вокруг среднего значения в пределах указанного диапазона температур).

b. Варианты, демонстрирующие отсутствие активной термостабилизации, имеют относительное превращение субстрата от 0 и ниже 0,15, обычно около 0,1. Не желая быть связанными любой конкретной теорией, можно думать, что измеренное относительное превращение субстрата обычно около 0,1 (а не 0,0, как следовало ожидать для неактивного фермента при данной температуре) является следствием неконтролируемых изменений, предельных в амплификаторе и/или в ходе манипулирования пробамми смесей.

"Термические свойства" является термином, обычно используемым для обозначения свойств фермента при более высоких температурах (например, 60°C или более). Термин может включать одну или обе "температурную стабильность", как определено выше, и "активную термостабилизацию", как описано выше.

"Эндоглюканазная активность" в контексте настоящего изобретения определена как каталитическое ускорение белком разрыва β -1,4-глюкозидных связей посредством нуклеофильной атаки полярной молекулой, такой как вода или органические молекулы с их гидроксил-, или меркапто-, или аминотрениями. Определение также включает расщепление синтетических молекул, имеющих неуглеводную молекулу, связанную с глюкозой, целлобиозой или лактозой, посредством β -1,4-глюкозидной связи. Примеры реакций, катализируемых эндоглюканазами, перечислены в базе данных Brenda (<http://www.brenda-enzymes.info> (Release 2012.1 (January 2012)); Enzyme data and metabolic information: BRENDA a resource for research in biology, biochemistry, and medicine, Schomburg, I., Hofmann, O., Baensch, C., Chang, A., Schomburg, D. Gene Fund, Dis. 3-4, 109-18 (2000)).

"Остаточная активность" определена как ферментативная активность, которая восстанавливается после инкубации фермента в течение определенного времени при определенной (повышенной) температуре по сравнению с активностью без стадии инкубации. Протокол для определения остаточной активности приводят в примере 4.

Выравнивание последовательностей с SEQ ID NO: 2.

Попарное выравнивание любой второй последовательности эндоглюканазы GH7 с родительской последовательностью (SEQ ID NO: 2) делают с использованием алгоритма ClustalW Algorithm (Larkin M.A., Blackshields G., Brown N.P., Chenna R., McGettigan P.A., McWilliam H., Valentin F., Wallace I.M., Wilm A., Lopez R., Thompson J.D., Gibson T.J. and Higgins D.G. (2007) ClustalW and ClustalX version 2. Bioinformatics 2007, 23(21): 2947-2948). Попарное выравнивание покажет номера положений для SEQ ID NO: 2. Указанные номера могут быть использованы для ссылки, например, когда говорят, что, например, остаток, соответствующий положению номер 2 (последовательности) SEQ ID NO: 2, является мутированным во второй эндоглюканазе GH7. В международных правилах нумерации аминокислот и обозначения вариантов белка для описания вариантов белка, аминокислоту в родительской белковой последовательности SEQ ID NO: 2 называют положением номер 1, или S1, или серин 1. Нумерация всех аминокислот будет согласно их положению в родительской последовательности, данной в SEQ ID NO: 2 относительно этого положения номер 1.

Идентичность последовательностей: для определения идентичности последовательностей используют программное обеспечение AlignX VectorNTI Package, которое продается Life Technology Corporation, с использованием стандартных установочных параметров (штраф (penalty) открывания гэпа 10, штраф (penalty) удлинения гэпа 0,1).

Варианты белков являются полипептидами, аминокислотная последовательность которых отличается в одном или нескольких положениях от данного родительского белка, в результате чего различия могут быть замещениями одного аминокислотного остатка (остатков) другими, делециями единственного аминокислотного остатка или нескольких аминокислотных остатков, или инсерцией (вставкой) дополнительного аминокислотного остатка (остатков), или фрагментами аминокислотного остатка (остатков) в родительскую последовательность. Белки могут быть модифицированы в определенных положениях введением точечных мутаций в кодирующие нуклеиновые кислоты. Термин модифицированная белковая последовательность в настоящем документе всегда относится к белкам, полученным в результате транскрипции и трансляции, а также возможных процессов посттрансляционной модификации и транслокации из модифицированных соответствующим образом нуклеиновых кислот, или *in vitro* или путем подходящего экспрессирующего хозяина. Способы создания таких вариантов белков хорошо известны в данной области техники и таким образом, не ограничиваясь, примеры включают случайный или сайт-направленный мутагенез, сайт-насыщающий мутагенез, сборку синтезированных ПЦР-фрагментов,

перетасовку ДНК, гомологичную рекомбинацию *in vitro* или *in vivo* и методы синтеза генов на основе химического синтеза ДНК.

Номенклатуру аминокислот, пептидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот выполняют согласно IUPAC (Международный союз теоретической и прикладной химии, ИЮПАК). В общем, аминокислоты названы в настоящем изобретении согласно однобуквенному коду.

Замены единичных аминокислот описывают путем именования однобуквенного кода исходной аминокислоты, за которым следует номер ее положения и однобуквенный код замещающей аминокислоты, т.е. замену глутамина в положении 1 на лейцин в этом положении описывают в виде "Q1L". Для делеций одиночных положений последовательности символ замещающей аминокислоты заменяют тремя буквами аббревиатурой "del", таким образом делеция аланина в положении 3 может быть названа "A3del". Вставленные (inserted) дополнительные аминокислоты получают номер предшествующего положения, продолженный строчной буквой в алфавитном порядке относительно их (аминокислот) расположения до их точки вставки. Таким образом, вставка двух триптофанов после положения 3 называется "3aW, 3bW". Введение нетранслируемых кодонов TAA, TGA и TAG в последовательность нуклеиновой кислоты обозначается как "*" в аминокислотной последовательности, таким образом введение терминирующего кодона в положение 4 аминокислотной последовательности называется "G4*". Множественные мутации разделяют знаком плюс, или косой чертой, или запятой. Например, две мутации в положениях 20 и 21, замещающие аланин и глутаминовую кислоту на глицин и серин, соответственно обозначаются в виде "A20G+E21S" или "A20G/E21S" "A20G,E21S". Когда аминокислотный остаток в данном положении замещают двумя или несколькими альтернативными аминокислотными остатками, то эти остатки разделяют запятой или косой чертой. Например, замещение аланина в положении 30 или глицином, или глутаминовой кислотой обозначают "A20G,E", или "A20G/E", или "A20G,A20E". Когда положение, подходящее для модификации, идентифицируют здесь без какой-либо предлагаемой специфической модификации, должно быть понятно, что любой аминокислотный остаток может быть замещен аминокислотным остатком, присутствующим в данном положении. Таким образом, например, при модификации аланина в положении 20, который упоминается, но не указан, должно быть понятно, что аланин может быть делегирован (удален) или замещен любым другим аминокислотным остатком (т.е. любым из R, N, D, C, Q, E, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y и V).

Термины "сходная мутация" или "сходная замена" относятся к аминокислотной мутации, где аминокислотный остаток в первой мутации (по отношению к родительской последовательности, такой как, например, SEQ ID NO: 2) снова заменен второй мутацией, и в результате чего аминокислотный остаток, привнесенный второй мутацией, имеет сходные свойства с аминокислотным остатком, который был привнесен первой мутацией. Сходный в контексте данного изобретения означает аминокислоту, которая имеет сходные химические свойства. Например, если первая мутация в конкретном положении приводит к замене неалифатического аминокислотного остатка (например, Ser) алифатическим аминокислотным остатком (например, Leu), тогда замена в одном и том же положении другой алифатической аминокислотой посредством второй мутации (например, Ile или Val) называется сходной мутацией. Дополнительные химические свойства включают размер остатка, гидрофобность, полярность, заряд, значение pK и т.п. Таким образом, сходная мутация может включать замены, такие как основные на основные, кислотные на кислотные, полярные на полярные и т.д. Произведенные таким образом наборы аминокислот, по-видимому, будут стабильными по структурным причинам. Эти наборы могут быть описаны в форме диаграммы Венна (Livingstone C.D. and Barton G.J. (1993) "Protein sequence alignments: a strategy for the hierarchical analysis of residue conservation", *Comput. Appl. Biosci.* 9: 745-756; Taylor W.R. (1986) "The classification of amino acid conservation", *J. Theor. Biol.* 119: 205-218). Сходные замены могут быть произведены, например, согласно последующим группам аминокислот: гидрофобные: F W Y H K M I L V A G; ароматические: F W Y H; алифатические: I L V; полярные: W Y H K R E D C S T; заряженные H K R E D; положительно заряженные: H K R; отрицательно заряженные: E D.

Экспрессирующая конструкция здесь определена как последовательность ДНК, содержащая все необходимые элементы последовательности для установления экспрессии в клетке-хозяине, содержащая открытую рамку считывания (ORF), включающая последовательности для инициации транскрипции (промоторы), терминирования и регуляции, сайты для инициации трансляции, области стабильной репликации или интеграции в геном хозяина и селективные генетические маркеры. Если требуется, открытая рамка считывания состоит из слияния нуклеиновой кислоты, кодирующей белок-мишень, с дополнительными элементами, особенно секреторными сигналами, целлюлозосвязывающим доменом, TAG-метками, для усиления уровня экспрессии или облегчения очистки или выделения из ферментативного бульона. Таким образом, функциональная структура может быть создана или достигнута уже путем упорядочивания (объединения и т.д.) события в клетке-хозяине. В предпочтительном воплощении экспрессирующая конструкция содержит промотор, функционально связанный с открытой рамкой считывания, за которым следует, если требуется, терминирующая последовательность (стоп-кодон). Предпочтительными промоторами являются промоторы от средних до сильных, функциональные в выбранных клетках-хозяевах в условиях ферментации. Для иллюстрации, примеры предпочтительных промоторов являются следующими:

бактерии (например, *Escherichia coli*): lac, tac, trp, tet, T3 T7, CP7, CP21, araBAD;
 дрожжи (например, *Pichia Saccharomyces*): AOXI, AOXII, FMDH, GAP, TEF, PFK1, FBA1, PGK1, ADH1, ADH2, TDH3;

грибы (например, *Trichoderma*): CBHI, CBHII, EGI, PGK, BGL, XYL1, XYL2.

Дополнительные примеры подходящих промоторов для гетерологичной экспрессии описаны в литературе. К другим частям экспрессирующей конструкции предъявляются требования к генетическим элементам для стабильно наследуемых признаков введенных нуклеиновых кислот и селективных маркеров, включающих генетические элементы, относящиеся к (маркерам) устойчивости к антибиотикам, или комплектациям определенной ауксотрофии штамма-хозяина.

Последовательность всех нуклеиновых кислот настоящего изобретения, или нуклеиновых кислот, кодирующих полипептиды/белки данного изобретения, может быть скорректирована для использования оптимальных кодонов в выбранном экспрессирующем хозяине. Нуклеиновые кислоты, имеющие такое оптимизированное/оптимальное использование кодона для конкретного экспрессирующего хозяина, также являются частью настоящего изобретения. "Хозяин для получения" используется в данном документе как синоним к "экспрессирующий хозяин" и означает организм, который при культивировании продуцирует белок настоящего изобретения. В одном воплощении белок настоящего изобретения не секретируется хозяином для получения; однако в предпочтительном варианте белок секретируется в окружающую среду. Такие организмы предпочтительно выбраны из царства бактерий, архей, дрожжей, грибов и/или растений. Одним предпочтительным экспрессирующим хозяином является *Pichia pastoris*.

"Бактерии" в данном документе будет относиться к прокариотическим организмам. В предпочтительном воплощении бактериями являются зубактерии, и даже более предпочтительно они выбраны среди рода *Escherichia*, *Bacillus*, *Klebsiella*, *Streptomyces*, *Lactococcus* и *Lactobacillus*, в частности *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus megaterium*, *Klebsiella planticola*, *Streptomyces lividans*, *Lactococcus lactis*, *Lactobacillus brevis*.

"Дрожжи" в данном документе будет относиться ко всем низшим эукариотическим организмам, демонстрирующим одноклеточное вегетативное состояние в их жизненном цикле. Дрожжи особенно включают организмы класса *Saccharomycetes*, в частности рода *Saccharomyces*, *Pachysolen*, *Pichia*, *Candida*, *Yarrowina*, *Debaromyces*, *Kluyveromyces*, *Zygosaccharomyces*.

"Мицелиальные грибы" или "грибы" в данном документе будет относиться ко всем низшим эукариотическим организмам, демонстрирующим рост гифов на протяжении по меньшей мере одной стадии их жизненного цикла. Грибы особенно включают организмы типа *Ascomycota* и *Basidiomycota*, в частности рода *Trichoderma*, *Taiaromyces*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Chrysosporium*, *Phanerochaete*, *Thermoascus*, *Agaricus*, *Pleurotus*, *Irpex*.

"Растение" в данном документе будет относиться ко всем эукариотическим организмам, принадлежащим к царству растений. В предпочтительном воплощении экспрессирующий хозяин выбран из растений рода *Zea*, *Triticum*, *Hordeum*, *Secale*, *Miscanthus*, *Saccharum*, *Solarium*, *Ipomea*, *Manihot*, *Helianthus*, *Camellia*, *Aspalathus*, *Eucalyptus*, *Beta*, *Fagus*, членов семейства *Pinaceae*, *Betulaceae*, *Malvaceae*, *Cupressaceae*, *Rosaceae*, *Arecaceae*.

Композиция фермента предназначена быть в виде любой жидкости или композиции твердого вещества, содержащей фермент в качестве фракции.

Дополнительные компоненты предпочтительно содержат воду, полиолы, сахара, детергенты, буферные агенты, восстановители, неорганические соли, твердые носители, консерванты, особенно с антибактериальной или противогрибковой активностью, красители, ароматизирующие вещества и/или отдушки.

Применение эндоглюканаз, в частности, таких как эндоглюканазы настоящего изобретения (неограничивающие примеры): гидролиз лигноцеллюлозного сырья для производства мономерных, димерных или олигомерных сахаров; производство пульпы и бумаги; применения в текстильной промышленности для улучшения или общего производства волокон, нитей или денима; применения для очистки для применений в промышленности или в бытовой химии; выпуск питательных веществ, повышение выхода продукции или улучшение свойств теста в области пищевых продуктов и кормов.

Подробное описание изобретения

Данное изобретение имеет отношение к эндоглюканазам GH7 с улучшенными свойствами. Более конкретно, изобретение имеет отношение к термостабильным белкам эндоглюканазам (полипептидам). Представленными решениями являются:

1) белок, имеющий эндоглюканазную активность, который принадлежит к GH7-классу, и который демонстрирует активную термостабилизацию;

2) белок, имеющий эндоглюканазную активность, который содержит аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 96%, предпочтительно по меньшей мере 97%, более предпочтительно по меньшей мере 98%, даже более предпочтительно по меньшей мере 99%, такую как по меньшей мере 99,5% идентичность с SEQ ID NO: 2.

Эти два воплощения подробно описаны ниже.

Температурная стабильность определена выше. Пример определения температурной стабильности

дан в примере 4. Эндоглюканы GH7-класса приведены в табл. 1 (ЕС 3.2.1.4). За исключением конкретных ограничений идентичностей последовательностей в конкретной формуле изобретения, изобретение имеет отношение к вариантам всех эндоглюканаз GH7-класса, содержащиеся в данном документе варианты эндоглюканаз показаны в табл. 1.

Таблица 1

Известные эндоглюканы GH7-класса

	Название белка	Организм	Банк генов	Банк данных 3-D структур белков
1	целлюлаза III-A (пептидный фрагмент)	<i>Acremonium cellulolyticus</i>		
2	эндо-β-1,4-глюканаза (EglB; AN3418.2)	<i>Aspergillus nidulans</i> FGSC A4	EAA63386.1	
3	эндо-β-1,4-глюканаза (CelB)	<i>Aspergillus oryzae</i> KBN616	BAA22589.1	
4	эндо-β-1,4-глюканаза (CelB; AO090010000314)	<i>Aspergillus oryzae</i> RIB40	AEB00821.1	
5	эндо-β-1,4-глюканаза I	<i>Aspergillus terreus</i> MS-31	ADR78837.1	
6	эндо-β-1,3-1,4-глюканаза (Bgl7A)	<i>Bispora</i> sp. MEY-1 / CGMCC 2500	ACT53749.1	
7	эндоглюканаза I (EG I) (пептидный фрагмент) (Cel7C)	<i>Chrysosporium lucknowense</i>		
8	эндо-β-1,4-глюканаза (CLhgEG1)	<i>Coptotermes lacteus</i> symbiont WH2002	BAC07551.1	
9	эндо-β-1,4-глюканаза (CLhgEG2)	<i>Coptotermes lacteus</i> symbiont WH2002	BAC07552.1	
10	эндо-β-1,4-глюканаза (EglB)	<i>Emmericella nidulans</i>	AAM54071.1	
11	эндо-β-1,4-глюканаза I (EG I; Egl1; Fof7) (Cel7B)	<i>Fusarium oxysporum</i>	AAA65586.1	1OWW[A,B,C,D]
12	эндоглюканаза 3 (HmEG3) (фрагмент)	<i>Holomastigotoides mirabile</i>	BAB64565.1	
13	эндоглюканаза 2 (HmEG2)	<i>Holomastigotoides mirabile</i>	BAB64564.1	
14	эндоглюканаза 1 (HmEG1)	<i>Holomastigotoides mirabile</i>	BAB64563.1	
15	эндо-β-1,4-глюканаза I (Egl1; EG-I)	<i>Humicola grisea</i> var. <i>thermoidea</i>	BAA09786.1	
16	эндоглюканаза I (EG I; EG1) (Cel7B)	<i>Humicola insolens</i>	AAE25068.1	1A39[A]
17	эндо-β-1,4-глюканаза I (Egl1; Egl1; EG-I) (Cel7B)	<i>Hypocrea jecorina</i>	AAA34212.1	1EG1[A,C]
18	эндоглюканаза I (Egl1)	<i>Hypocrea jecorina</i> M5	ADM08177.1	
19	эндо-β-1,4-глюканаза (Egl1)	<i>Hypocrea jecorina</i> PTCC 5142	AAX28897.1	
20	эндоглюканаза I	<i>Hypocrea pseudokoningii</i>	ABM90986.1	
21	эндоглюканаза I (Egl1)	<i>Hypocrea pseudokoningii</i> 3.3002	AEQ29501.1	
22	эндоглюканаза I (Egl1)	<i>Hypocrea rufa</i>	AEO17039.1	
23	эндо-β-1,4-глюканаза I (Egl1; Bgl1)	<i>Hypocrea rufa</i> AS 3.3711	AAQ21382.1	
24	эндоглюканаза I	<i>Hypocrea rufa</i> HK-75		
25	эндо-β-1,4-глюканаза (Egl1; MG02532.4)	<i>Magnaporthe grisea</i> 70-15	XP_366456.1	
26	эндоглюканаза	<i>Myceliophthora thermophila</i> CBS 117.65	AAE25067.1	
27	эндоглюканаза I (Egl1) (Cel7B)	<i>Penicillium decumbens</i> 114-2	ABY56790.1	
28	эндоглюканаза I (Egl1)	<i>Penicillium decumbens</i> L-06	ACJ15337.1	
29	эндоглюканаза I (Egl1; Egl1)	<i>Penicillium oxalicum</i>	ACS32299.1	
30	эндоглюканаза (Cel7B)	<i>Penicillium purpurogenum</i>	AEL78899.1	
31	эндоглюканаза (Bgl7C7)	<i>Penicillium</i> sp. C7	AEG74551.1	
32	эндо-β-1,4-глюканаза (Egl1) (пептидные фрагменты) (Cel7B)	<i>Penicillium verruculosum</i>		
33	эндоглюканаза 3 (PgEG3)	<i>Pseudotrichonympha grassii</i>	BAB64562.1	
34	эндоглюканаза 2 (PgEG2)	<i>Pseudotrichonympha grassii</i>	BAB64561.1	
35	эндоглюканаза 1 (PgEG1h)	<i>Pseudotrichonympha grassii</i>	BAB64553.1	
36	Egl1 (фрагмент)	<i>Trichoderma asperellum</i> T203	AAS37698.1	
37	эндоглюканаза I	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> 3.1029	AEI71804.1	
38	эндоглюканаза I (Egl1)	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> 36MS	AEC03714.1	
39	эндо-β-1,4-глюканаза (Egl1; Egl1; TICel7A) (Cel7A)	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> CECT 2606	1920181A	
40	эндоглюканаза I	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> FU05	ACZ34302.1	
41	эндоглюканаза I (Egl1; Egl1)	<i>Trichoderma</i> sp. SSL	ACH68455.1	
42	эндо-β-1,4-глюканаза (RsSymEG1; SM2038B11)	некультивированные симбиотические простейшие (термитов) <i>Reticulitermes speratus</i>	BAF57296.1	

Первый и второй аспекты ниже будут описаны подробно.

Первый аспект. Белок, имеющий эндоглюканазную активность, который принадлежит к GHT-классу и который демонстрирует активную термостабилизацию.

В первом аспекте данного изобретения белки имеют эндоглюканазную активность и улучшенные термические свойства. Улучшенные термические свойства определены в виде температурной стабильности, которая проявляется в относительной активности превращения субстрата выше чем 90% (например, выше чем 95%) при инкубации при температурах 60°C или выше и (в виде) активной термостабилизации. Активная термостабилизация описана ниже.

Авторами настоящего изобретения неожиданно было обнаружено, что белки, демонстрирующие активную термостабилизацию, также демонстрируют температурную стабильность.

Это было показано последующим примером. Авторы получили эндоглюканазу GH7, которая является конкретным вариантом SEQ ID NO: 4 (т.е. вариантом, заданным SEQ ID NO: 2), следующим образом. Нуклеиновую кислоту, кодирующую полипептид с SEQ ID NO: 2, получали случайным мутагенезом (допускающей ошибки ПЦР, как описано в примере 1). Способы случайного мутагенеза хорошо известны в данной области. Кроме того, теперь, когда авторы в данном изобретении раскрыли пригодность полипептида, кодируемого SEQ ID NO: 2, соответствующая нуклеиновая кислота, кодирующая этот белок, может быть получена непосредственно специалистом в данной области техники. Способы ее получения включают, например, синтез гена или сайт-направленный мутагенез, начиная с нуклеиновой кислоты с высокой степенью идентичности последовательностей (например, более чем 90%) с SEQ ID NO: 4 и введение мутаций сайт-направленным мутагенезом (в одну или несколько стадий) для получения нуклеиновой кислоты, кодирующей белок SEQ ID NO: 2. Стартовой последовательностью, из которой нуклеиновая кислота, кодирующая SEQ ID NO: 2, может быть получена путем мутагенеза, является Cel7B из *Nyporeia pseudokonigii*, представленная в данном документе в виде SEQ ID NO: 4 (номер доступа в банке генов ABM90986).

Авторы настоящего изобретения исследовали температурную стабильность белка, имеющего SEQ ID NO: 2. Как видно на фиг. 3, этот белок решает техническую проблему, лежащую в основе настоящего изобретения, т.е. (белок) имеет более высокую температурную стабильность, чем его родительский белок (SEQ ID NO: 4). Это является очевидным, например, из того факта, что относительное превращение субстрата все еще находится вблизи его максимума, например при 60°C, в то время как относительное превращение субстрата белка, имеющего SEQ ID NO: 4, находится на очень низком уровне при указанной температуре (см. фиг. 3).

К удивлению авторов настоящего изобретения оказалось, что даже при высоких температурах, например в диапазоне от 68 до 76°C (включая от 70 до 74°C), относительное превращение субстрата существенно не падает с повышением температуры. Это находится в резком контрасте со свойствами родительского белка, имеющего SEQ ID NO: 4, который на графике в зависимости от повышающихся температур демонстрирует уменьшение относительного превращения субстрата, уменьшение падает до фоновых уровней без какого-либо промежуточного плато. Считается, что белок, имеющий SEQ ID NO: 4, под действием высоких температур, например 60°C или более, таких как 70°C или более, не находится в его активном состоянии. Не желая быть связанными любой конкретной теорией, считается, что этот эффект обусловлен тепловым разворачиванием (или сворачиванием (фолдингом) в неактивные конформации) белка. Не желая быть связанными любой конкретной теорией, эффект потери активности при высоких температурах в последующем будет называться тепловым разворачиванием. Тепловое разворачивание является хорошо известным феноменом для белков практически любого типа, конкретно ферментов, при высоких температурах. Таким образом, тепловое разворачивание, наблюдаемое для белка, имеющего SEQ ID NO: 4, соответствует ожиданиям специалистов в данной области техники. Белок SEQ ID NO: 4 не является частью данного изобретения.

В резком контрасте белок этого аспекта изобретения демонстрирует фазу плато при более высоких температурах, например в диапазоне от 68 до 76°C (включая от 70 до 74°C). Это плато находится ниже максимума относительного превращения субстрата, но выше, чем фон относительного превращения субстрата. Не желая быть связанными любой конкретной теорией, авторы настоящего изобретения делают заключение, что белок данного изобретения находится при этих высоких температурах в состоянии, которое отличается от свернутого состояния при низких температурах (например, 46°C), но этот белок еще является ферментативно активным. Таким образом, можно предположить, что при высоких температурах белок данного изобретения интенсивно свернут повторно, т.е. повторно свернут для получения дополнительного активного состояния (и таким образом, предоставляя возможность наблюдать относительное превращение субстрата при более высоких температурах). Следовательно, авторы изобретения назвали это свойство, которое также определено выше в разделе определений как "активная термостабилизация".

Таким образом, белок изобретения решает технические проблемы, лежащие в основе настоящего изобретения, будучи термостабильным. Кроме того, на основе раскрытия настоящего изобретения квалифицированному специалисту в данной области техники дается методическое руководство для идентификации других белков согласно этому первому аспекту изобретения.

Такие дополнительные белки могут быть найдены следующим образом. Сначала любой тип мута-

ций (включающих делецию, вставку или замену одного или нескольких аминокислотных остатков, и причем случайно или направленно) может быть введен в любую эндоглюканазу семейства GH7, конкретно в любую из названных в табл. 1, для получения мутантного белка или его библиотеки. Полученный таким образом мутантный белок или его библиотека могут быть подвергнуты скринингу на активную термостабилизацию, как определено выше. Известные белки, представленные в табл. 1 выше, не являются частью изобретения, но любые их мутанты, демонстрирующие активную термостабилизацию, включены в данное изобретение.

Важно, что все ферменты согласно первому аспекту настоящего изобретения, т.е. ферменты, которые демонстрируют активную термостабилизацию, как определено выше, демонстрируют температурную стабильность, как определено выше. Таким образом, активная термостабилизация является по первому аспекту решением проблемы, лежащей в основе настоящего изобретения. Так или иначе, любой данный белок соответствует первому аспекту данного изобретения и может быть надежно протестирован путем анализа на активную термостабилизацию, предоставленную выше.

Второй аспект. Белок, имеющий эндоглюканазную активность, который содержит аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 96%, предпочтительно по меньшей мере 97%, более предпочтительно по меньшей мере 98%, даже более предпочтительно по меньшей мере 99%, такую как по меньшей мере 99,5% идентичность с SEQ ID NO: 2.

В поиске второго решения проблемы, лежащей в основе настоящего изобретения, авторы изобретения приступили к проекту по мутагенезу, начиная с белка SEQ ID NO: 2. Таким образом, авторы изобретения ввели мутации, такие как точечные мутации, в белок, имеющий SEQ ID NO: 2 (т.е. путем модификации, лежащей в основе нуклеиновой кислоты, как описано ниже). Авторы изобретения обнаружили, что многие такие мутанты также демонстрируют температурную стабильность и таким образом решают лежащую в основе проблему во втором аспекте. Примеры решений приведены на фиг. 3.

Таким образом, во втором аспекте изобретение имеет отношение к белку, имеющему эндоглюканазную активность, который содержит аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 96%, предпочтительно по меньшей мере 97%, более предпочтительно по меньшей мере 98%, даже более предпочтительно по меньшей мере 99%, такую как по меньшей мере 99,5% идентичность с SEQ ID NO: 2. Этот белок обычно может принадлежать к GH7-классу.

Конкретно, настоящее изобретение также обеспечивает конкретные мутанты белка с последовательностью SEQ ID NO: 2. Таким образом, последовательность, предоставленную в SEQ ID NO: 2, модифицируют в одном или нескольких (предпочтительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 или 19) положениях. Такая модификация может состоять из замены, делеции, вставки и т.п. В конкретном ее воплощении модификация заключается в замещении. Даже в более конкретном воплощении модификация заключается в замещении одного или нескольких конкретных положений SEQ ID NO: 2, которые выделены в крайней левой колонке табл. 2-4.

Наряду с такой модификацией в любом из этих предоставленных положений в принципе может быть замещение на любой аминокислотный остаток, предпочтительно, что замещение является заменой на аминокислотный остаток, предоставленный в линии номер 4 любой одной или нескольких табл. 2, 3 или 4, или на аминокислотный остаток, сходный с ним (сходная мутация, как определено выше). Таким образом, сходные мутации, как определено выше, могут быть введены вместо перечисленных мутаций. Пример 5 демонстрирует некоторые из таких мутантов. Способы введения мутаций известны в данной области. Приводимое в качестве примера руководство может быть взято из примера 1. Другими словами, предпочтительное воплощение данного изобретения имеет отношение к предпочтительным положениям для мутагенеза эндоглюканазы GH7-класса. Перечень предпочтительных замен предоставляют в табл. 2, линия 2. В другом предпочтительном воплощении предпочтительные мутации выбраны из перечня в табл. 3, линия 2. В другом предпочтительном воплощении изобретения предпочтительные мутации выбраны из табл. 4, линия 2. Также возможно объединить два или три из этих предпочтительных воплощений, например одна или несколько предпочтительных замен, предоставленных в табл. 2, могут быть объединены с одной или несколькими предпочтительными заменами, предоставленными в табл. 3 и/или 4.

Таблица 2
Предпочтительные замены аминокислот в отношении SEQ ID NO: 2

Альтернативные замены аминокислот для Seq. ID NO: 2	Наиболее предпочтительные аминокислоты в эндотоксинах GH7 путем выравнивания ClustalW с Seq. ID NO: 2	Предпочтительные аминокислоты в эндотоксинах GH7 путем выравнивания ClustalW с Seq. ID NO: 2	Положение аминокислоты в Seq. ID NO: 2	Положение Seq. ID NO: 2
линия 4	линия 3	линия 2	линия 1	
Q	L,Q	L,Q	L	2
	T	T,C	T	8
	T	T,C	T	16
	K	K,E	K	19
H	S,H	S,H	S	23
	N	N,D	N	30
S	Y,S	Y,S	Y	32
	W	W,R	W	41
M	I,M	I,M	I	42
	N	N,Y	N	48
C	G,C	G,C	G	55
H,K	E,H,K	E,H,K	E	64
D	A,D	A,D	A	65
C	G,C	G,C	G	67
C,G	S,C,G	S,C,G	S	68
	G	G,C	G	75
S	N,S	N,S	N	86
D	S,D	S,C,D,F,T	S	88
H,R	N,H,R	N,H,R,Y	N	93
S	T,S	T,S	T	104
	S	S,T	S	107
	K	K,E	K	118
D	A,D	A,D	A	137
	A	A,G	A	144
	S	S,A	S	145
E	Q,E	Q,E	Q	150
	E	E,K	E	153
	G	G,S	G	164
Q	Q,L	Q,L	Q	179
D,E	T,D,E	T,D,E	T	185
K	Q,K	Q,K	Q	191
	F	F,S	F	193
F	L,F	L,F	L	201
M	L,M	L,M,Y	L	210
	P	P,L,S	P	212
	N	N,T	N	216
	A	A,Y	A	217
H,K	R,H,K	R,G,H,K	R	231
	G	G,N	G	233
	P	P,S	P	235
	G	G,D	G	242
R	P,R	P,R	P	249
	G	G,C	G	261
T	P,T	P,T	P	263
K	T,K	T,K	T	271
D,E	N,D,E	N,D,E	N	277
E	T,E	T,E	T	290
	S	S,T	S	293
E	T,E	T,A	T	299
D,S	E,D,S	E,D,S	E	312
	I	I,V	I	317
	N	N,W	N	322
	D	D,N	D	323
	S	S,T	S	325
	Y	Y,F	Y	327
	M	M,K	M	328
E,S	D,E,S	D,E,S	D	335
	N	N,V,W	N	352

357	H	H,E	H,E	E
360	Y	Y,F	Y	
379	P	P,L	P,L	L
382	P	P,del	P	
383	P	P,del	P	
390	S	S,L	S	
391	T	T,I	T,I	I
392	A	A,T	A,T	T
398	S	S,T	S,T	T
405	I	I,T	I,T	T
431	Y	Y,H	H	
432	S	S,G	S,G	G
434	D	D,Y	D,Y	Y
448	H	H,Y	H	

Таблица 3

Предпочтительные замены аминокислот в отношении SEQ ID NO: 2

Положение Seq. ID NO: 2	Положение аминокислоты в Seq ID NO: 2	Предпочтительные аминокислоты в эндонуклеазах GH7 путем выравнивания с Seq. ID NO: 2	Наиболее предпочтительные аминокислоты в эндонуклеазах GH7 путем выравнивания с Seq. ID NO: 2	Альтернативные замены аминокислот для Seq. ID NO: 2
	линия 1	линия 2	линия 3	линия 4
23	S	S,H	S,H	H
30	N	N,D	N	
41	W	W,R	W	
55	G	G,C	G,C	C
64	E	E,H,K	E,H,K	H,K
65	A	A,D	A,D	D
67	G	G,C	G,C	C
118	K	K,E	K	
137	A	A,D	A,D	D
144	A	A,G	A	
150	Q	Q,E	Q,E	E
164	G	G,S	G	
179	Q	Q,L	Q	
185	T	T,D,E	T,D,E	D,E
191	Q	Q,K	Q,K	K
201	L	L,F	L,F	F
212	P	P,L,S	P	
216	N	N,T	N	
231	R	R,G,H,K	R,H,K	H,K
242	G	G,D	G	
249	P	P,R	P,R	R
261	G	G,C	G	
263	P	P,T	P,T	T
271	T	T,K	T,K	K
277	N	N,D,E	N,D,E	D,E
290	T	T,E	T,E	E
299	T	T,A	T,E	E
312	E	E,D,S	E,D,S	D,S
323	D	D,N	D	
325	S	S,T	S	
328	M	M,K	M	
335	D	D,E,S	D,E,S	E,S
357	H	H,E	H,E	E
379	P	P,L	P,L	L
390	S	S,L	S	
391	T	T,I	T,I	I
405	I	I,T	I,T	T
432	S	S,G	S,G	G
434	D	D,Y	D,Y	Y

Таблица 4
Предпочтительные замены аминокислот в отношении SEQ ID NO: 2

Положение Seq ID NO: 2	Положение аминокислоты в Seq ID NO: 2	Предпочтительные аминокислоты в эндоглюканазах GH7 путем выравнивания ClustalW с Seq ID NO: 2	Наиболее предпочтительные аминокислоты в эндоглюканазах GH7 путем выравнивания ClustalW с Seq ID NO: 2	Альтернативные замены аминокислот для Seq ID NO: 2
	линия 1	линия 2	линия 3	линия 4
2	L	L,Q	L,Q	Q
8	T	T,C	T	
16	T	T,C	T,C	C
19	K	K,E	K	
32	Y	Y,S	Y,S	S
42	I	I,M	I,M	M
48	N	N,Y	N	
68	S	S,G	S,G	G
75	G	G,C	G	
86	N	N,S	N,S	S
88	S	S,C,D,F,T	S,C	C
93	N	N,H,R,Y	N	
104	T	T,S	T,S	S
107	S	S,T	S	
145	S	S,A	S	
153	E	E,K	E	
193	F	F,S	F	
210	L	L,M,Y	L	
217	A	A,Y	A	
233	G	G,N	G	
235	P	P,S	P	
293	S	S,T	S	
317	I	I,V	I	
322	N	N,W	N	
327	Y	Y,F	Y	
352	N	N,V,W	N,V	V
360	Y	Y,F	Y	
382	P	P,del	P	
383	P	P,del	P	
392	A	A,T	A,T	T
398	S	S,T	S,T	T
431	Y	Y,H	H	
448	H	H,Y	H	

Первый и второй аспекты изобретения, хотя и являются различными решениями одной и той же проблемы, не обязательно являются взаимоисключающими. Таким образом, данное изобретение имеет отношение к белкам, выполняющим условия как первого аспекта, так и второго аспекта, описанных выше. Важно отметить, что первый аспект и второй аспект являются двумя альтернативными решениями проблемы обеспечения ферментов GH7 с улучшенной температурной стабильностью. Эти решения являются независимыми (хотя для некоторых примеров частично перекрывающимися) и таким образом не обязательно должны быть объединены. Например, белок, идентифицированный в виде [6] на фиг. 3, демонстрирует температурную стабильность по сравнению с белком, имеющим SEQ ID NO: 4 ([2] на фиг. 3), но еще не демонстрирует активную термостабилизацию.

Таким образом, изобретение обеспечивает много различных вариантов фермента согласно первому аспекту, выше и/или согласно второму аспекту, выше. Демонстрирует ли любой предоставленный фермент необходимые термические свойства (температурную стабильность и/или активную термостабилизацию) может быть легко протестировано тестом, озаглавленным "Определение термостабильности и/или активной термостабилизации", выше.

Как подробно изложено выше в разделе определений, а также детально определено в примерах ниже, здесь кратко изложено как необходимые мутации могут быть получены

попарным выравниванием любой последовательности эндоглюканазы GH7 с SEQ ID NO: 2 с использованием алгоритма ClustalW;

идентификацией соответствующих положений (линия 1) в последовательности-мишени эндоглюканазы GH7;

модификацией соответствующих положений последовательности-мишени эндоглюканазы GH7 согласно предполагаемым предпочтительным заменам, предоставленным в линии 2, или предпочтительно в линии 3;

экспрессией модифицированной последовательности и тестированием экспрессируемого белка на улучшенные термические свойства.

Считается, что термостабильные ферменты по изобретению также получают с пониженным обра-

зованием агломератов при более высоких температурах, и таким образом с пониженной преципитацией. Предотвращение таких преципитатов особенно предпочтительно при наличии в разработанных лоскутах, денеме или тканевых материалах, а также для применений в мембранных реакторах, для снижения характеристик засорения мембраны.

Слитые белки, содержащие любой белок по изобретению, также являются частью данного изобретения.

Другой аспект настоящего изобретения имеет отношение к получению белков по изобретению путем гетерологичной экспрессии в хозяине для получения, также называемым экспрессирующим хозяином. Способы гетерологичной экспрессии содержат перенос нуклеиновой кислоты, кодирующей белок по изобретению (экспрессирующая конструкция), в хозяин для получения путем трансформации, трансфекции, скрепления или эквивалентными способами переноса в отношении нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Способы трансформации в смысле данного изобретения конкретно не ограничиваются. Сообщалось о примерах для различных видов, и (способы трансформации) включают электропорацию, трансформацию протопластов, химическую трансформацию и перенос с использованием частиц для баллистической трансформации, микроинъекцию, инфицирование вирусом, перекрестное скрепление или применение природных компетентных штаммов или клеточных линий. Предпочтительный хозяин для получения совместно секретирует эндоглюканазу по изобретению с другими целлюлазами, гемицеллюлазами или пектиназами в культуральную жидкость. Таким образом, предпочтительным является то, что кодирующая последовательность в экспрессирующей конструкции кодирует эндоглюканазу данного изобретения с предшествующим сигналом для секреции из конкретного штамма-хозяина. Такие сигналы хорошо известны специалистам в данной области; например в *Eubacteria*, они называются сигнальными пептидами. Не желая быть связанными конкретной теорией, эти сигналы имеют общую способность направлять секрецию белка типично котрансляционным способом. Предпочтительным экспрессирующим хозяином является *Trichoderma reesei*.

Дополнительным аспектом данного изобретения является применение описанных выше белков эндоглюканаз. Дополнительный аспект включает применения очищенных, частично очищенных или неочищенных препаратов белка как таковых или в композиции фермента, а также применение целых клеток или организмов, экспрессирующих белок-мишень. Области применений эндоглюканаз могут быть найдены в главе "Область изобретения". Как указано там, применение термостабильных белков крайне необходимо. Предпочтительное применение эндоглюканазы лежит в области ферментативного превращения лигноцеллюлозы.

Обзор описанных здесь последовательностей.

Seq. ID NO	Тип	Функция	Источник
1	ДНК	Последовательность ДНК, кодирующая Seq. ID NO:2 (эндоглюканазы GH7 по изобретению) – использование кодона, адаптированного для <i>Pichia pastoris</i>	Искусственный
2	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
3	ДНК	Последовательность ДНК, кодирующая Seq. ID NO: 4 (эндоглюканазы GH7 Cel7B DNA) – использование адаптированного кодона	Искусственный
4	Белок	Эндоглюканазы I (Cel7B) – последовательность зрелого белка	<i>Hypocrea pseudokonigii</i> - ABM90986
5	Белок	Эндоглюканазы I (Cel7B) – последовательность зрелого белка	Искусственный
6	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
7	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
8	Белок	Эндоглюканазы I (Cel7B) – вариант последовательности зрелого белка	Искусственный
9	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
10	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
11	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
12	Белок	Эндоглюканазы GH7 по изобретению – последовательность зрелого белка	Искусственный
13	Белок	Эндоглюканазы I (Cel7B) – вариант последовательности зрелого белка	Искусственный
14	Белок	Эндоглюканазы I (Cel7B) – вариант последовательности зрелого белка	Искусственный
15	ДНК	Последовательность ДНК, кодирующая Seq. ID NO. 2 с N-концевой 6 х гистидиновой меткой Histidine TAG (<i>italic</i>) с сигнальным пептидом SP _{mta} (подчеркнуто) в <i>pichia pastoris</i>	Искусственный
16	ДНК	Последовательность ДНК, кодирующая Seq. ID NO. 2 в слиянии с сигнальным пептидом CBHI (подчеркнуто) для экспрессии в <i>Trichoderma reesei</i>	Искусственный

Последовательности, описанные здесь (NO: 1-16).

SEQ ID NO: 1

TCTCTGCAGCCAGGAACCTTCTACTCCAGAGGTGCACCCAAAGCTGACCACCTACAAGTGTAACACCTCTGGT
GGTTGTGTGTGCTCAGAACACCTATGTTGTTCTGGACTGGAACCTACAGATGGATCCACGACGCCAACTACAACCTCTTG
TACCGTGAACGGTGGTGTCAACACTACTCTGTGTCCAGACGAGGCTACTGGTAGCAAGAACTGCTTCATCGAGGGTG
TTGACTACGCTGCTTCTGGTGTACTGCCAATGGTTCTACCTTGACCCTGAACCAAGTACATGCCATCTTCTCTGGC
GGTTACACTTCTGTGTCGCCAAGACTGACTTGTGGTCCAGACGGTAAGTACGTTATGCTGAAGCTGAACGGACA
GGAGCTGTCTTTTGACGTTGACCTGTCTGCTTTGCCATGTGGAGAGAACGCTTCTCTGTACCTGTCTCAGATGGACG
AGAACGGTGGAGCTAACCAGTACAACACCGCCGGTGCTAACTACGGTTCTGGTTACTGTGACGCCCACTGTCCAGTT
CAGACTTGAGAAACGGAACCTGAACACTTCTGGCCAGGGATTCTGCTGTAACGAGATGGACATCTTGAGGGGAAA
CTCTAGAGCTAACGCTCTGACCCCACTCTTGTAACTACCGCTTGTGACTCTGCTGGTTGCGGTTTTAACCCTAT
ACCGCTCGGGTTACCCAACTACTTTGGCCAGGTGGCACTGTTGACACCTCGAAGCCATTACCATCATCACCAG
TTCAACACCGACAACGGTTCTCCATCTGGTAACCTGGTGTGATCACCAGAAAGTACAGACAGAACGGCGTTGACAT
CCCATCTGCTAAACCAAGGTGGCGACACCATTTCTGTTGCTCATCTGCCTCTACTTACGGTGGATTGGCTACCATGG
GAAAGGCTCTGTCCGAGGGAATGGTGTGATCTTCTCGATCTGGAACGACAACCTCGCAGTACATGAAGTGGCTGGAC
TCTGGTGATGCTGGTCCATGTTCTTCTACCGAGGCAACCCATCTAACATCTGGCTAACACCTGGTACTCAGCT
GGTGTCTCGAACATTAGATGGGGCGACATTGGTTCTACCACTACCTACCGGTGGTAACCCACCACCACCCTG
CATCTTCTACCACTTCTCGACCGCCAGAAGATCGTCTACCTCCTCTTCTTCTCCATCTTGTATCCAGACTCACTGG
GGTCAGTGTGGTGGTATTGGCTACACCGCTGTAAGACCTGTACCTCTGGAACCACTTGCCAGTACAGCAACGACTA
CTACTCTCAGTGCCTGTGA

SEQ ID NO: 2

SLQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTYVVLWDWNYRWIHDANYNSCTVNGGVNNTLCPEATGSKNCF
IEGVDAASGVTANGSTLTNLQYMPSSSGGYTSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENASLYLS
QMDENGANQYNTAGANYGSYCDACPVQVQWNRGTLNLTSGQFCCNEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
FNPYRSGYPNYFPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSIIRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASTYGG
ATMGKALSEGMLIFSIWNDNSQYMNWLDSDAGFCSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTNTSTGGNPP
PPASSTTFSTARSSSTSSSPSCIQTHWQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYSNDYYSQCL*

SEQ ID NO: 3

TCTCAGCAGCCAGGAACCTTCTACTCCAGAGGTGCACCCAAAGCTGACCACCTACAAGTGTAACACCTCTGGT
GGTTGTGTGTGCTCAGGACACCTCTGTTGTTCTGGACTGGAACCTACAGATGGATGCACGACGCCAACTACAACCTCTTG
TACCGTGAACGGTGGTGTCAACACTACTCTGTGTCCAGACGAGGCTACTTGTGGCAAGAACTGCTTCATCGAGGGTG
TTGACTACGCTGCTTCTGGTGTACTGCCTCTGGTTCTACCTTGACCCTGAACCAAGTACATGCCATCTTCTCTGGC
GGTTACTCTTCTGTGTCGCCAAGACTGTACTTGTGGTCCAGACGGTGAGTACGTTATGCTGAAGCTGAACGGACA
GGAGCTGTCTTTTGACGTTGACCTGTCTGCTTTGCCATGTGGAGAGAACGTTCTCTGTACCTGTCTCAGATGGACG
AGAACGGTGGAGCTAACCAGTACAACACCGCCGGTGCTAACTACGGTTCTGGTTACTGTGACGCCCACTGTCCAGTT
CAGACTTGAGAAACGGAACCTGAACACTTCTGGCCAGGGATTCTGCTGTAACGAGATGGACATCTTGAGGGGAAA
CTCTAGAGCTAACGCTCTGACCCCACTCTTGTACTGCTACCGCTTGTGACTCTGCTGGTTGCGGTTTTAACCCTAT
ACGGCTCGGGTTACCCAACTACTTTGGCCAGGTGACACTGTTGACACCTCGAAGCCATTACCATCATCACCAG
TTCAACACCGACAACGGTTCTCCATCTGGTAACCTGGTGTGATCACCAGAAAGTACAGACAGAACGGCGTTGACAT
CCCATCTGCTAAACCAAGGTGGCGACACCATTTCTGTTGCTCATCTGCCTCTGCTTACGGTGGATTGGCTACCATGG
GAAAGGCTCTGCTCTGGAATGGTGTGATCTTCTCGATCTGGAACGACAACCTCGCAGTACATGAAGTGGCTGGAC
TCTGGTTCTGTGGTCCATGTTCTTCTACCGAGGCAACCCATCTAACATCTGGCTAACACCTGGTACTCAGCT
GGTGTACTCGAACATTAGATGGGGCGACATTGGTTCTACCACTACCTACCGGTGGTAACCCACCACCACCCTG
CATCTTCTACCACTTCTCGACCAAGATCGTCTACCACTCTTCTTCTCCATCTTGTATCCAGACTCACTGG
GGTCAGTGTGGTGGTATTGGCTACACCGCTGTAAGACCTGTACCTCTGGAACCACTTGCCAGTACGGCAACGACTA
CTACTCTCAGTGCCTGTGA

SEQ ID NO: 4

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQDTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGEYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENGSLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGDVTDSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDGSGAGPCSSTEGNPSNILLANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 5

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQDTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGEYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENGSLYLS
 QMDKNGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGDVTDSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDGSGAGPCSSTEGNPSNILLANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 6

SLQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATGGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTTLNQYMPSSSGGYTSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGGTVDTSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASTYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDGSGAGPCSSTEGNPSNILLANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCIQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYSNDYYSQCL*

SEQ ID NO: 7

SLQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTYVVLDWNYRWHHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATGSKNCF
 IEGVDYAASGVTANGSTLTTLNQYMPSSSGGYTSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGGTVDTSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASTYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDGSGAGPCSSTEGNPSNILLANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCIQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYSNDYYSQCL*

SEQ ID NO: 8

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGGTVDTSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDGSGAGPCSSTEGNPSNILLANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 9

SLQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCCKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFDDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGKGFCCEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYGSYPNYFGPGGTVDTSKPFITITQFNTDNGSPSGNLVSITRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL

ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDSGSAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYSDYYSQCL*

SEQ ID NO: 10

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCNEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYKSGYPNYFGPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSI TRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSEGMLIFSIWNDNSQYMNWLDSGSAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 11

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCNEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYKSGYPNYFGPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSI TRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSDGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDSGEAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 12

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWMHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTASGSTLTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGKYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENASLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCNEMDILEGNSRANALTPHSCNATACDSAGCG
 FNPYKSGYPNYFGPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSI TRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSDGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDSGSAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 13

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWIHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCSKNCF
 IEGVDYAASGVTANGSTLTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGEYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENGLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCNEMDILEGNSRANALTPHSCATACDSAGCG
 FNPYKSGYPNYFGPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSI TRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDSGSAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 14

SQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTTSGGCVAQNTSVVLDWNYRWIHDANYNSCTVNGGVNTTLCPEATCGKNCF
 IEGVDYAASGVTANGSTLTLNQYMPSSSGGYSSVSPRLYLLGPDGEYVMLKLNQELSFVDVLSALPCGENGLYLS
 QMDENGGANQYNTAGANYGSGYCDACQCPVQVQWRNGTLNTSGQGFCNEMDILEGNSRANALTPHSCATACDSAGCG
 FNPYKSGYPNYFGPGGTVDTSKPFTIITQFNTDNGSPSGNLVSI TRKYRQNGVDIPSAKPGGDTISSCPSASAYGGL
 ATMGKALSSGMVLIFSIWNDNSQYMNWLDSGSAGPCSSSTEGNPSNILANNPGTHVVYSNIRWGDIGSTTNSTGGNPP
 PPPASSTTFSTTRRSSTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYTGCKTCTSGTTCQYGN DYYSQCL*

SEQ ID NO: 15

atgagatttccttcaatttttactgcagttttattcgcagcatcctccgcattagctgctccagtcaacact
acaacagaagatgaaacggcacaaattccggctgaagctgtcatcggttacttagatttagaaggggatttcgatgt
tgctgttttgccattttccaacagcacaaataacgggttattgtttataaataactactattgccagcattgctgcta

aagaaagagggtatctttggataaaacgtgaggcggaagcattgccaccaccaccaccaccactctctccggctctctg
cagccaggaaacttctactccagaggtgcacccaagctgaccacctacaagtgtaaccacctctggtggttgtgtgc
tcagaacacctatgttgttctggactggaactacagatggatccacgacgcacaactacaactcttgtaacctggaacg
gtggtgtcaacactactctgtgtccagacgaggtctactggtagcaagaactgcttcatcgagggtgttgactacgtc
gcttctggtgttactgccaatggttctaccttgacctgaaccagtacatgccacttctctctggcgggttaaccttc
tgtgtcgcaagactgtacttgttgggtccagacggttaagtagcttatgctgaagctgaacggacaggagctgtctt
tgacgttgacctgtctgcttggcatgtggagagaacgcttctctgtacctgtctcagatggacgagaaacgggtgga
gctaaccagtaacaacccgcgggtgtctaactacgggttctggttactgtgacgcccagtgctcagttcagacttgga
aacgggaacctgaacacttctggtccagggtattctgctgaacgagatggacatcttgaggggaaactctagagcta
acgctctgaccccaactcttgaatgctacgcgttctgctctgctggttcgggttttaaccctataccgctcggt
taccaaaactactttggcccagggtggcactgttgacacctcgaagccattcaccatcatcaccagttcaacacga
caacggttctccatctggtaaacctggtgtcgatcaccagaaagtacagacagaacggcggtgacatcccactctgcta
aacaggttgcgcacacattctgcttctgtccatctgcctctacttaccgttqgatttggtacatcgggaaggctctg
tccagggaatggtgctgatcttctcgatctggaacgacaactcgcagtaacgaactggctggactctggtgatgc
tggtccatgttcttctaccgagggaacccatctaactcttggttaacaaccttggtactacgtggtgtactcga
acattagatggggcgacattggttctaccaccaactctaccggtggttaaccaccaccaccacctgcattcttacc
accttctgcagcccgagaagatcgctacacctctcttcttctccatcttgatccagactcactggggtcagtggtg
tggattgtgctacacgggctgtaagacctgtacctctggaaccttgccagtaacgacaacgactactactctcagt
gcctgtga

SEQ ID NO: 16:

atgtatcggaagtgtggcgtctatctcggccttcttggccacagcagcggtcttctctgcaaccggtaccagc
acccccgaggtccatcccaagtgtgacaacctacagtgtagcaacctcggggggtgctggtgccagaacctatgt
ggtccttgactggaactaccgctggatccacgacgcaaactacaactcgtgcaccgtcaacggcggtgctcaacacac
cgctctgccctgacgaggcgaccggtagcaagaactgcttcatcgagggcgctgactacgccgctcggcgctcacg
gccaatggcagcaccctcaccctgaaccagtacatgccagcagctctggcggtacactagctctctcctcggt
gtatctcctgggtccagacggttaagtacgtgatgctgaagctcaacggccaggagctgagcttcgacgtcgacctt
ctgctctgcggtgtggagagaacgcctcgtctacactgtctcagatggacgagaacggggcgccaacagtataac
acggccggtgccaaactacgggagcggtactcgatgctcagtgcccgctccagacatggaggaaacggcaccctcaa
cactagcggccagggtcttctgctgcaacgagatggatatcctggagggcaactcgagggcgaatgccttgaccttc
actcttgcaatgccacggcctgcgactctgcgggttgcggttcaaccctatcgacgaggctacccaaactacttc
ggccccggaggcgaccgttgacacctccaagccattcaccatcatcaccagttcaaacaggacaaacggctcgccctc
gggcaacctgtgagcatcacccgcaagtacagacaaaacggcgtcgacatcccagcgccaaacccggcgggcgaca
ccatctcgtcctgccgtccgctcaacttacggcggtcgcgcccatgggcaaggccctgagcgagggtcatggtg
ctcatcttcagcatttggaacgacaaacagccagtacatgaactggtcgcagacggcgatgcgggccctgcagcag
caccgagggcaaccatccaactcctggccaacaaccccggtacgcacgtcgtctactccaacatccgtggggag
acattgggtctactacgaactcgactggtggtccgcccccgctgcgtccagcagcagcttttcgactgcgccggag
agctcgacgtcctcgagcagcccgagctgcacccagctcactggggcgagtcggttggttggttacacgggggtg
caagacgtgcacgtcgggcactacgtgccagtatagcaacgactactactcgcaatgcctttaa

Примеры

Пример 1. Создание библиотек и конкретных вариантов.

Библиотеку на основе SEQ ID NO: 3 (библиотека "N7") получали с использованием SEQ ID NO: 3 в качестве матрицы путем ошибочно-направленной ПЦР с использованием полимеразы Taq исходя из опубликованного протокола (Jouce et al.) с использованием следующих условий ПЦР: 2 мин при 95°C, 30 циклов (1 мин при 95°C, 1 мин при 56°C, 1 мин при 72°C, 5 мин при 72°C). Все продукты, полученные в результате ПЦР, очищали с помощью набора QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, Hilden, Germany).

Конкретные варианты SEQ ID NO: 3 получали путем модифицированного протокола ПЦР с использованием праймеров, содержащих мутировавшую нуклеотидную последовательность (Ho, S.N. et al., Gene; 1989; 77: 51-9).

Пример 2. Экспрессия в *Pichia pastoris*.

Конструирование линейной экспрессирующей кассеты (LEC).

LECs (Liu Z., et al., Chembiochem. 2008 Jan 4; 9 (1):58-61) с маркером Zeocin и GAP-промотором конструировали путем модифицированного протокола ПЦР.

Трансформация и культивирование *Pichia pastoris*.

Компетентные клетки получали и трансформировали, как описано (Lin-Cereghino, J., et al., BioTechniques. 2005, 38, 44-48). Трансформанты отбирали на чашках с YPD на агаровой основе, содержащей Zeocin (зеоцин) 100 мг/л, и собирали в чашки с глубокими лунками (DWP) (BMD5% 250 мл/лунку) с использованием автоматического устройства для сбора (колоний) (QPix2, Genetix). Инокулированные DWP культивировали в течение 60 ч при 28°C, влажности 80% и встряхивании 280 об/мин.

Пример 3. Экспрессия в *Trichoderma reesei*.

Конструкция экспрессирующего вектора *Trichoderma reesei*.

Расщепленную *SbfI/SwaI*, линейаризованную ДНК плазмиды pV7 (фиг. 2), трансформировали в

Trichoderma reesei SCF41, по существу, как описано Penttila et al., 1997. Селекцию трансформантов делали на чашках со средой Mandel's Andreotti, содержащей гигромицин в качестве селективного агента (100 мг/л). Трансформанты проверяли ПЦР.

Пример 4. Определение способности к превращению субстрата при различных температурах для указания термостабильности вариантов SEQ ID NO: 2 с использованием 4-метилумбеллиферрил- β -D-целлобиозида (4-MUC).

Для точного сравнения термостабильности 10 мкл культуральных супернатантов *Pichia pastoris*, содержащих секретируемые варианты эндоглюканазы, инкубировали с 90 мкл 100 мкМ 4-MUC (растворенного в натрий-ацетатном буфере (50 мМ, pH 5,0)) в градиенте температуры термоциклера Eppendorf Gradient Thermocycler. 24 реакционных смеси инкубировали в градиенте температуры, простирающимся от 45 до 65°C и от 55 до 75°C (каждую реакционную смесь выдерживали при уникальном постоянном уровне температуры) в течение 1 ч. Ферментативная активность при соответствующей температуре может быть определена после добавления 100 мкл 1 М раствора углекислого натрия в каждую реакционную смесь и (после) измерения интенсивности флуоресценции при 360/454 нм в планшет-ридере Tecan Infinite M200. Для сравнения термостабильности значения (сигналов) флуоресценции в каждой температурной точке, относительную ферментативную активность определяли путем деления на максимальное значение серий (нормализация к 1). Температурный профиль для любого данного фермента получали построением графика относительной ферментативной активности в диапазоне измеряемых температур.

Пример 5. Активная термостабилизация некоторых вариантов эндоглюканазы.

Этот пример описывает примеры удивительного эффекта активной термостабилизации. В этом примере использовали белки (культуральный супернатант) (табл. 5 ниже), экспрессируемые в *Pichia pastoris*.

Фиг. 3 демонстрирует установленные свойства белков по изобретению: белки, названные как [1], [4], [5], [7]-[10], демонстрируют активную термостабилизацию и температурную стабильность, тогда как белки, названные как [3] и [6], демонстрируют температурную стабильность, но не активную термостабилизацию.

Таблица 5

Белки, протестированные в примерах 5-7

Обозначение	SEQ ID NO:	Фигура, №	Мутации по отношению к Seq. ID NO: 2
EGI <i>Hypocrea pseudoconingii</i>	Seq. ID NO: 4	[2]	L2Q, N30D, Y32S, I42M, G67C, S68G, N86S, T104S, K118E, A144G, N216T, R231G, G242D, T299A, E312S, D335S, A392T, S398T, I405T, S432G
Вариант EGI <i>Hypocrea pseudokoningii</i> (E153K по отношению к Seq. ID NO: 4)	Seq. ID NO: 5	[3]	L2Q, N30D, Y32S, I42M, G67C, S68G, N86S, T104S, K118E, A144G, E153K, N216T, R231G, G242D, T299A, E312S, D335S, A392T, S398T, I405T, S432G
EG/вариант по изобретению; полученный мутагенезом из последовательности EGI <i>Hypocrea pseudokoningii</i>	Seq. ID NO: 2	[1]	
Пример варианта 1 Seq. ID NO: 2	Seq. ID NO: 6	[4]	Y32S, I42M, S68G, N86S, T104S, R231G, E312S, D335S, A392T
Пример варианта 2 Seq. ID NO: 2	Seq. ID NO: 7	[5]	R231G, E312S, D335S, A392T

Вариант EGI <i>Hypocrea pseudokoningii</i> (по отношению к Seq. ID NO: 4)	Seq. ID NO: 8	[6]	,L2Q,Y32S,I42M,G67C,S68G,N86S,T104S,R231 G,T299A, E312S,D335S,A392T,S398T,I405T,S432G
Пример варианта 3 Seq. ID NO:2	Seq. ID No: 9	[7]	,Y32S,I42M,G67C,S68C,N86S,T104S,Q191K,R23 1G,T299A,E312S,D335S,A392T,S398T,I405T
Пример варианта 4 Seq. ID NO:2	Seq. ID No: 10	[8]	,L2Q,Y32S,I42M,G67C,S68G,N86S,T104S,R231 K,T299A, D335S,A392T,S398T,I405T,S432G
Пример варианта 5 Seq. ID NO:2	Seq. ID No: 11	[9]	,L2Q,Y32S,I42M,G67C,S68G,N86S,T104S,R231 G,T299A, E312D,D335E,A392T,S398T,I405T,S432G
Пример варианта 6 Seq. ID NO:2	Seq. ID NO:12	[10]	,L2Q,Y32S,I42M,G67C,S68G,N86S,T104S,R231 K,T299A, E312D,D335S,A392T,S398T,I405T,S432G
Пример варианта 7 Seq. ID No: 2	Seq. ID NO:13		,L2Q,N30D,Y32S,G67C,T104S,K118E,A144G,N2 16T,R231G,G242D,T299A,E312S,D335S,A392T, S398T,I405T,S432G
Пример варианта 8 Seq. ID No: 2	Seq. ID NO:14		,L2Q,N30D,Y32S,G67C,S68G,T104S,K118E,A14 4G,N216T, R231G,G242D,T299A,E312S,D335S,A392T,S398 T,I405T, S432G

Пример 6. Определение высвобождения редуцирующих сахаров на соломе.

Высвобождение редуцирующих сахаров на соломе определяли путем нанесения предварительно обработанной кислотой пшеничной соломы с массой сухого вещества 2,5%. Последующие ферменты добавляли в реакционную смесь: целлюбиогидролазу I (12,5 мг/л), бета-глюкозидазу (40 СБУ/мг (пер., СБУ - единиц карбоксипептидазы В) целлюбиогидролазы I) и тестировали вариант эндоглюканазы GH7 (12,5 мг/л). Гидролиз соломы инкубировали при 60°C путем постоянного встряхивания в течение 48 ч.

Пример 7. Определение температурного профиля вариантов SEQ ID NO: 2.

Для анализа активности с использованием MUL (4-метилумбеллиферрил-β-D-лактопиранозида), 10 мкл супернатанта после культивирования смешивали с 90 мкл 100 мкМ MUL в 25 мМ Na-ацетатном буфере, pH 4,8. Планшеты заклеивали и инкубировали в течение 2 ч со встряхиванием при 300 об/мин при 45 и 59°C каждый (для повторного скрининга также при 65°C). Реакцию гасили добавлением 100 мкл Na₂CO₃ на лунку.

Возбуждение осуществляли при 365 нм и флуоресценцию измеряли при 450 нм. Результаты показаны на фиг. 5.

Пример 8. Определение температурного профиля вариантов SEQ ID NO: 2.

Период полураспада ферментов определяли измерением остаточной активности с использованием анализа MUL, описанного в примере 7 после инкубации супернатантов культур *Pichia pastoris* после экспрессии при 70°C в течение от 0 до 7 мин на водяной бане. Пробы помещали в лед после точного периода инкубации до постановки анализа на активность.

Список последовательностей

<110> Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

<120> БЕЛОК, ИМЕЮЩИЙ ЭНДОГЛЮКАНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ, И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ОСАХАРИВАНИЯ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

<130> 164 411 n17

<140>

<141>

<150> EP12166458

<151> 2012-05-02

<160> 16

<170> PatentIn version 3.5

<210> 1

<211> 1323

<212> ДНК

<213> искусственная последовательность

<220>

<223> искусственная конструкция

<400> 1

tctctgcagc caggaacttc tactccagag gtgcacccaa agctgaccac ctacaagtgt	60
accacctctg gtggttgtgt tgctcagaac acctatgttg ttctggactg gaactacaga	120
tggatccacg acgccaacta caactcttgt accgtgaacg gtggtgtcaa cactactctg	180
tgtccagacg aggctactgg tagcaagaac tgcttcatcg aggggtgtga ctacgctgct	240
tctggtgtta ctgccaatgg ttctaccttg accctgaacc agtacatgcc atcttcctct	300
ggcggttaca cttctgtgtc gccaaactg tacttgttgg gtccagacgg taagtacgtt	360
atgctgaagc tgaacggaca ggagctgtct ttgacgttg acctgtctgc ttgccaatgt	420
ggagagaacg cttctctgta cctgtctcag atggacgaga acggtggagc taaccagtac	480
aacaccgccg gtgctaacta cggttctggt tactgtgacg cccagtgtcc agttcagact	540
tggagaaacg gaaccctgaa cacttctggc cagggattct gctgtaacga gatggacatc	600
ttggagggaa actctagagc taacgctctg accccacact cttgtaatgc taccgcttgt	660
gactctgctg gtgctgggtt taaccatac cgctcgggtt acccaacta ctttggccca	720
ggtggcactg ttgacacctc gaagccattc accatcatca cccagtcca caccgacaac	780
ggttctccat ctggtaacct ggtgtcgatc accagaaagt acagacagaa cggcgttgac	840
atccccatctg ctaaaccagg tggcgacacc atttcgtctt gtccatctgc ctctacttac	900
ggtggatttg ctaccatggg aaaggctctg tccgagggaa tgggtctgat cttctcgatc	960
tggaacgaca actcgcagta catgaactgg ctggactctg gtgatgctgg tccatgttct	1020
tctaccgagg gcaaccatc taacatcctg gctaacaacc ctggtactca cgtggtgtac	1080
tcgaacatta gatggggcga cattggttct accaccaact ctaccggtgg taaccacca	1140
ccaccacctg catcttctac caccttctcg accgccagaa gatcgtctac ctctcttct	1200

tctccatctt gtatccagac tcaactggggt cagtgtggtg gtattggcta caccggctgt 1260
aagacctgta cctctggaac cacttgccag tacagcaacg actactactc tcagtgcctg 1320
tga 1323

<210> 2
<211> 440
<212> Белок
<213> искусственная последовательность

<220>
<223> искусственная конструкция

<400> 2

Ser Leu Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
1 5 10 15

Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Tyr
20 25 30

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Ile His Asp Ala Asn Tyr Asn
35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
50 55 60

Ala Thr Gly Ser Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Asn Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Thr Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

034175

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
 210 215 220
 Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Arg Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
 225 230 235 240
 Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
 245 250 255
 Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
 260 265 270
 Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
 275 280 285
 Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Thr Tyr Gly Gly Leu Ala
 290 295 300
 Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Glu Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
 305 310 315 320
 Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Asp Ala
 325 330 335
 Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Ala Arg Arg Ser Ser Thr Ser Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Ile Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Ser
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440

<210> 3
 <211> 1323
 <212> ДНК
 <213> Hypocrea pseudokonigii

<400> 3
 tctcagcagc caggaacttc tactccagag gtgcacccaa agctgaccac ctacaagtgt 60
 accacctctg gtgggtgtgt tgctcaggac acctctgttg ttctggactg gaactacaga 120

tggatgcacg acgccaacta caactcttgt accgtgaacg gtggtgtcaa cactactctg 180
 tgtccagacg aggtacttg tggcaagaac tgcttcatcg aggggtgtga ctacgctgct 240
 tctggtgtta ctgcctctgg ttctaccttg accctgaacc agtacatgcc atcttctctt 300
 ggcggttact cttctgtgtc gccaaactgt tacttgttgg gtccagacgg tgagtacgtt 360
 atgctgaagc tgaacggaca ggagctgtct tttagcgttg acctgtctgc ttgccaatgt 420
 ggagagaacg gttctctgta cctgtctcag atggacgaga acggtggagc taaccagtac 480
 aacaccgccg gtgctaacta cggttcttgt tactgtgacg cccagtgtcc agttcagact 540
 tggagaaacg gaaccctgaa cacttctggc cagggattct gctgtaacga gatggacatc 600
 ttggagggaa actctagagc taacgtcttg accccacact cttgtactgc taccgcttgt 660
 gactctgctg gttgcggttt taaccatac ggctcgggtt acccaacta ctttgccca 720
 ggtgacactg ttgacacctc gaagccattc accatcatca cccagttcaa caccgacaac 780
 ggttctccat ctggtaacct ggtgtcgatc accagaaagt acagacagaa cggcggtgac 840
 atccccatctg ctaaaccagg tggcgacacc atttctgtct gtccatctgc ctctgcttac 900
 ggtggatttg ctaccatggg aaaggctctg tcctctggaa tgggtctgat cttctcgatc 960
 tggaaacgaca actcgcagta catgaactgg ctggactctg gttctgctgg tccatgttct 1020
 tctaccgagg gcaaccatc taacatcctg gctaacaacc ctggtactca cgtggtgtac 1080
 tcgaacatta gatggggcga cattggttct accaccaact ctaccggtgg taaccaccca 1140
 ccaccacctg catcttctac caccttctcg accaccagaa gatcgtctac cacctcttct 1200
 tctccatctt gtaccagac tcaactgggt cagtgtggtg gtattggcta caccggctgt 1260
 aagacctgta cctctggaac cacttgccag tacggcaacg actactactc tcagtgcctg 1320
 tga 1323

<210> 4
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> Hypocrea pseudokonigii
 <400> 4

Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asp Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60
 Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80

034175

Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Glu Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Gly
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Thr Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Asp Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
275 280 285

Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
290 295 300

Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
305 310 315 320

Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
325 330 335

Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
340 345 350

034175

Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440
 <210> 5
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> искусственная последовательность
 <220>
 <223> искусственная конструкция
 <400> 5
 Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asp Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60
 Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80
 Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
 85 90 95
 Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
 100 105 110
 Leu Gly Pro Asp Gly Glu Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
 115 120 125
 Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Gly
 130 135 140

034175

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Lys Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Thr Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Asp Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
275 280 285

Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
290 295 300

Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
305 310 315 320

Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
325 330 335

Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
340 345 350

Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
355 360 365

Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
370 375 380

Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
385 390 395 400

Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
405 410 415

034175

Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
420 425 430

Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
435 440

<210> 6
<211> 440
<212> Белок
<213> искусственная последовательность

<220>
<223> искусственная конструкция

<400> 6

Ser Leu Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
1 5 10 15

Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Ser
20 25 30

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
50 55 60

Ala Thr Gly Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

034175

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
275 280 285

Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Thr Tyr Gly Gly Leu Ala
290 295 300

Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
305 310 315 320

Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
325 330 335

Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
340 345 350

Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
355 360 365

Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
370 375 380

Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Ser Ser Ser
385 390 395 400

Ser Pro Ser Cys Ile Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
405 410 415

Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Ser
420 425 430

Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
435 440

<210> 7
<211> 440
<212> Белок
<213> искусственная последовательность

<220>
<223> искусственная конструкция

034175

<400> 7

Ser Leu Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
1 5 10 15

Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Tyr
20 25 30

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Ile His Asp Ala Asn Tyr Asn
35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
50 55 60

Ala Thr Gly Ser Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Asn Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Thr Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

034175

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
 275 280 285
 Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Thr Tyr Gly Gly Leu Ala
 290 295 300
 Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
 305 310 315 320
 Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
 325 330 335
 Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Ser Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Ile Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Ser
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440
 <210> 8
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> искусственная последовательность
 <220>
 <223> искусственная конструкция
 <400> 8
 Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu

034175

50	55	60
Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala 65 70 80		
Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met 85 90 95		
Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu 100 105 110		
Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu 115 120 125		
Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala 130 135 140		
Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr 145 150 155 160		
Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys 165 170 175		
Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly 180 185 190		
Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn 195 200 205		
Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly 210 215 220		
Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro 225 230 235 240		
Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe 245 250 255		
Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg 260 265 270		
Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly 275 280 285		
Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala 290 295 300		
Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile 305 310 315 320		
Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala 325 330 335		

Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440
 <210> 9
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> искусственная последовательность
 <220>
 <223> искусственная конструкция
 <400> 9
 Ser Leu Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60
 Ala Thr Cys Cys Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80
 Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
 85 90 95
 Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
 100 105 110
 Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu

034175

115 120 125
 Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
 130 135 140
 Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
 145 150 155 160
 Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
 165 170 175
 Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Lys Gly
 180 185 190
 Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
 195 200 205
 Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
 210 215 220
 Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
 225 230 235 240
 Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
 245 250 255
 Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
 260 265 270
 Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
 275 280 285
 Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
 290 295 300
 Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
 305 310 315 320
 Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
 325 330 335
 Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400

Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
405 410 415

Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Ser
420 425 430

Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
435 440

<210> 10
<211> 440
<212> Белок
<213> искусственная последовательность

<220>
<223> искусственная конструкция

<400> 10

Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
1 5 10 15

Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Ser
20 25 30

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
50 55 60

Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly

034175

[illegible]

<212> Белок
 <213> искусственная последовательность
 <220>
 <223> искусственная конструкция
 <400> 11

Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15

Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asn Thr Ser
 20 25 30

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60

Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
 85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
 100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
 115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
 130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
 145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
 165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
 180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
 195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
 210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
 225 230 235 240

Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe

034175

245										250										255									
Asn	Thr	Asp	Asn	Gly	Ser	Pro	Ser	Gly	Asn	Leu	Val	Ser	Ile	Thr	Arg														
			260					265					270																
Lys	Tyr	Arg	Gln	Asn	Gly	Val	Asp	Ile	Pro	Ser	Ala	Lys	Pro	Gly	Gly														
		275					280					285																	
Asp	Thr	Ile	Ser	Ser	Cys	Pro	Ser	Ala	Ser	Ala	Tyr	Gly	Gly	Leu	Ala														
	290					295					300																		
Thr	Met	Gly	Lys	Ala	Leu	Ser	Asp	Gly	Met	Val	Leu	Ile	Phe	Ser	Ile														
305					310					315					320														
Trp	Asn	Asp	Asn	Ser	Gln	Tyr	Met	Asn	Trp	Leu	Asp	Ser	Gly	Glu	Ala														
				325					330					335															
Gly	Pro	Cys	Ser	Ser	Thr	Glu	Gly	Asn	Pro	Ser	Asn	Ile	Leu	Ala	Asn														
			340					345					350																
Asn	Pro	Gly	Thr	His	Val	Val	Tyr	Ser	Asn	Ile	Arg	Trp	Gly	Asp	Ile														
		355					360					365																	
Gly	Ser	Thr	Thr	Asn	Ser	Thr	Gly	Gly	Asn	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Ala														
	370					375					380																		
Ser	Ser	Thr	Thr	Phe	Ser	Thr	Thr	Arg	Arg	Ser	Ser	Thr	Thr	Ser	Ser														
385					390					395					400														
Ser	Pro	Ser	Cys	Thr	Gln	Thr	His	Trp	Gly	Gln	Cys	Gly	Gly	Ile	Gly														
			405						410					415															
Tyr	Thr	Gly	Cys	Lys	Thr	Cys	Thr	Ser	Gly	Thr	Thr	Cys	Gln	Tyr	Gly														
			420					425					430																
Asn	Asp	Tyr	Tyr	Ser	Gln	Cys	Leu																						
		435				440																							
<210>	12																												
<211>	440																												
<212>	Белок																												
<213>	искусственная последовательность																												
<220>																													
<223>	искусственная конструкция																												
<400>	12																												
Ser	Gln	Gln	Pro	Gly	Thr	Ser	Thr	Pro	Glu	Val	His	Pro	Lys	Leu	Thr														
1				5					10					15															
Thr	Tyr	Lys	Cys	Thr	Thr	Ser	Gly	Gly	Cys	Val	Ala	Gln	Asn	Thr	Ser														
			20					25					30																

034175

Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Met His Asp Ala Asn Tyr Asn
35 40 45

Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
50 55 60

Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
65 70 75 80

Ser Gly Val Thr Ala Ser Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
85 90 95

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Lys Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Ala
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Asn Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Lys Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Gly Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
275 280 285

Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
290 295 300

Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Asp Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile

034175

305 310 315 320
 Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
 325 330 335
 Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440

 <210> 13
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> искусственная последовательность

 <220>
 <223> искусственная конструкция

 <400> 13
 Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asp Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Ile His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60
 Ala Thr Cys Ser Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80
 Ser Gly Val Thr Ala Asn Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
 85 90 95

034175

Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
100 105 110

Leu Gly Pro Asp Gly Glu Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
115 120 125

Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Gly
130 135 140

Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
165 170 175

Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
180 185 190

Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
195 200 205

Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Thr Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
210 215 220

Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
225 230 235 240

Gly Asp Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
245 250 255

Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
260 265 270

Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
275 280 285

Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
290 295 300

Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
305 310 315 320

Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
325 330 335

Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
340 345 350

Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
355 360 365

Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala

034175

370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu
 435 440
 <210> 14
 <211> 440
 <212> Белок
 <213> ИСКУССТВЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
 <220>
 <223> ИСКУССТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
 <400> 14
 Ser Gln Gln Pro Gly Thr Ser Thr Pro Glu Val His Pro Lys Leu Thr
 1 5 10 15
 Thr Tyr Lys Cys Thr Thr Ser Gly Gly Cys Val Ala Gln Asp Thr Ser
 20 25 30
 Val Val Leu Asp Trp Asn Tyr Arg Trp Ile His Asp Ala Asn Tyr Asn
 35 40 45
 Ser Cys Thr Val Asn Gly Gly Val Asn Thr Thr Leu Cys Pro Asp Glu
 50 55 60
 Ala Thr Cys Gly Lys Asn Cys Phe Ile Glu Gly Val Asp Tyr Ala Ala
 65 70 75 80
 Ser Gly Val Thr Ala Asn Gly Ser Thr Leu Thr Leu Asn Gln Tyr Met
 85 90 95
 Pro Ser Ser Ser Gly Gly Tyr Ser Ser Val Ser Pro Arg Leu Tyr Leu
 100 105 110
 Leu Gly Pro Asp Gly Glu Tyr Val Met Leu Lys Leu Asn Gly Gln Glu
 115 120 125
 Leu Ser Phe Asp Val Asp Leu Ser Ala Leu Pro Cys Gly Glu Asn Gly
 130 135 140
 Ser Leu Tyr Leu Ser Gln Met Asp Glu Asn Gly Gly Ala Asn Gln Tyr
 145 150 155 160

Asn Thr Ala Gly Ala Asn Tyr Gly Ser Gly Tyr Cys Asp Ala Gln Cys
 165 170
 Pro Val Gln Thr Trp Arg Asn Gly Thr Leu Asn Thr Ser Gly Gln Gly
 180 185 190
 Phe Cys Cys Asn Glu Met Asp Ile Leu Glu Gly Asn Ser Arg Ala Asn
 195 200 205
 Ala Leu Thr Pro His Ser Cys Thr Ala Thr Ala Cys Asp Ser Ala Gly
 210 215 220
 Cys Gly Phe Asn Pro Tyr Gly Ser Gly Tyr Pro Asn Tyr Phe Gly Pro
 225 230 235 240
 Gly Asp Thr Val Asp Thr Ser Lys Pro Phe Thr Ile Ile Thr Gln Phe
 245 250 255
 Asn Thr Asp Asn Gly Ser Pro Ser Gly Asn Leu Val Ser Ile Thr Arg
 260 265 270
 Lys Tyr Arg Gln Asn Gly Val Asp Ile Pro Ser Ala Lys Pro Gly Gly
 275 280 285
 Asp Thr Ile Ser Ser Cys Pro Ser Ala Ser Ala Tyr Gly Gly Leu Ala
 290 295 300
 Thr Met Gly Lys Ala Leu Ser Ser Gly Met Val Leu Ile Phe Ser Ile
 305 310 315 320
 Trp Asn Asp Asn Ser Gln Tyr Met Asn Trp Leu Asp Ser Gly Ser Ala
 325 330 335
 Gly Pro Cys Ser Ser Thr Glu Gly Asn Pro Ser Asn Ile Leu Ala Asn
 340 345 350
 Asn Pro Gly Thr His Val Val Tyr Ser Asn Ile Arg Trp Gly Asp Ile
 355 360 365
 Gly Ser Thr Thr Asn Ser Thr Gly Gly Asn Pro Pro Pro Pro Ala
 370 375 380
 Ser Ser Thr Thr Phe Ser Thr Thr Arg Arg Ser Ser Thr Thr Ser Ser
 385 390 395 400
 Ser Pro Ser Cys Thr Gln Thr His Trp Gly Gln Cys Gly Gly Ile Gly
 405 410 415
 Tyr Thr Gly Cys Lys Thr Cys Thr Ser Gly Thr Thr Cys Gln Tyr Gly
 420 425 430
 Asn Asp Tyr Tyr Ser Gln Cys Leu

435	440	
<210>	15	
<211>	1620	
<212>	ДНК	
<213>	искусственная последовательность	
<220>		
<223>	искусственная конструкция	
<400>	15	
atgagatttc	cttcaatttt tactgcagtt ttattcgcag catcctccgc attagctgct	60
ccagtcaaca	ctacaacaga agatgaaacg gcacaaattc cggctgaagc tgtcatcggc	120
tacttagatt	tagaagggga tttcgatgtt gctgttttgc cattttccaa cagcacaaat	180
aacgggttat	tgtttataaa tactactatt gccagcattg ctgctaaaga agaaggggta	240
tctttggata	aacgtgaggc ggaagcatgc caccaccacc accaccactc ctccggctct	300
ctgcagccag	gaacttctac tccagaggtg caccctaaagc tgaccaccta caagtgtacc	360
acctctggtg	gttgtgttgc tcagaacacc tatgttgttc tggactggaa ctacagatgg	420
atccacgacg	ccaactacaa ctcttgtagc gtgaacggcg gtgtcaacac tactctgtgt	480
ccagacgagg	ctactggtag caagaactgc ttcacgagg gtgttgacta cgctgcttct	540
ggtgttactg	ccaatgggtc taccttgacc ctgaaccagt acatgccatc ttcctctggc	600
ggttacactt	ctgtgtcgcc aagactgtac ttgttgggtc cagacggtaa gtacgttatg	660
ctgaagctga	acggacagga gctgtctttt gacgttgacc tgtctgcttt gccatgtgga	720
gagaacgctt	ctctgtacct gtctcagatg gacgagaacg gtggagctaa ccagtacaac	780
accgccggtg	ctaactacgg ttctgggtac tgtgacgccc agtgtccagt tcagacttgg	840
agaacgggaa	ccctgaacac ttctggccag ggattctgct gtaacgagat ggacatcttg	900
gagggaaact	ctagagctaa cgctctgacc ccacactctt gtaatgtac cgcttgtagc	960
tctgctggtt	gcggtttttaa cccataccgc tcgggttacc caaactactt tggcccaggc	1020
ggcactgttg	acacctcgaa gccattcacc atcatcacc agttcaacac cgacaacggc	1080
tctccatctg	gtaacctggt gtcgatcacc agaaagtaca gacagaacgg cgttgacatc	1140
ccatctgcta	aaccagggtg cgacaccatt tcgtcttgtc catctgcctc tacttacggc	1200
ggattggcta	ccatgggaaa ggctctgtcc gaggggaatg tgctgatctt ctcgatctgg	1260
aacgacaact	cgcagtacat gaactggctg gactctgggtg atgctgggtc atgttcttct	1320
accgagggca	accatctaa catcctggct aacaaccctg gtactcacgt ggtgtactcg	1380
aacattagat	ggggcgacat tggttctacc accaactcta ccggtggtaa cccaccacca	1440
ccacctgcat	cttctaccac ctctctgacc gccagaagat cgtctacctc ctcttcttct	1500
ccatcttgta	tccagactca ctggggctag tgtgggtgga ttggctacac cggctgtaag	1560
acctgtacct	ctggaaccac ttgccagtac agcaacgact actactctca gtgcctgtga	1620
<210>	16	
<211>	1368	

<212>	ДНК	
<213>	искусственная последовательность	
<220>		
<223>	искусственная конструкция	
<400>	16	
atgtatcgga agttggccgt catctcggcc ttcttggcca cagcacgggc ttctctgcaa		60
ccgggtacca gcaccccgga ggtccatccc aagttgacaa cctacaagtg tacaacctcc		120
gggggggtgcg tggcccaaga cacctatgtg gtccttgact ggaactaccg ctggatccac		180
gacgcaaaact acaactcgtg caccgtcaac ggcggcgta acaccacgct ctgccctgac		240
gaggcgaccg gtagcaagaa ctgcttcacg gagggcgctg actacgccgc ctcgggcgtc		300
acggccaatg gcagcacctt caccctgaac cagtacatgc ccagcagctc tggcggctac		360
actagcgtct ctccctcggc gtatctcctg ggtccagacg gtaagtacgt gatgctgaag		420
ctcaacggcc aggagctgag cttcgacgtc gacctctctg ctctgccgtg tggagagaac		480
gcctcgtctt acctgtctca gatggacgag aacggggggc ccaaccagta taacacggcc		540
ggtgccaaact acgggagcgg ctactgcgat gctcagtgcc ccgtccagac atggagggaac		600
ggcacctca acactagcgg ccaggggctt tgctgcaacg agatggatat cctggagggc		660
aactcgaggg cgaatgcctt gaccctcac tcttgcaatg ccacggcctg cgactctgcc		720
ggttgcggct tcaacccta tcgcagcggc tacccaaact acttcggccc cggaggcacc		780
gttgacacct ccaagccatt caccatcatc acccagttca acacggacaa cggtctgccc		840
tcgggcaacc ttgtgagcat caccgcaag tacagacaaa acggcgctga catccccagc		900
gccaaaccg gcggcgacac catctcgtcc tgcccgtccg cctcaactta cggcggcctc		960
gccaccatgg gcaaggccct gagcgagggc atgggtgctc tcttcagcat ttggaacgac		1020
aacagccagt acatgaactg gctcgacagc ggcgatgccg gccctgcag cagcaccgag		1080
ggcaaccat ccaacatcct ggccaacaac cccggtacgc acgtcgtcta ctccaacatc		1140
cgctggggag acattgggtc tactacgaac tcgactggtg gtccgcccc gcctgcgtcc		1200
agcacgacgt ttctgactgc ccggaggagc tcgacgtcct cgagcagccc gagctgcatc		1260
cagactcact gggggcagtg cgggtggcatt gggtagaccg ggtgcaagac gtgcacgtcg		1320
ggcactacgt gccagtatag caacgactac tactcgcaat gcctttaa		1368

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Белок, имеющий эндоглюканазную активность, который содержит аминокислотную последовательность, идентичную по меньшей мере на 96% последовательности SEQ ID NO: 2, включающий по меньшей мере одну мутацию, выбранную из замен, показанных в табл. 2-4, который демонстрирует по меньшей мере 90%-ную остаточную способность к превращению субстрата при его инкубации в течение 1 ч при температуре 60°C.

2. Белок по п.1, который содержит аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 97%, предпочтительно по меньшей мере 98%, более предпочтительно по меньшей мере 99%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 99,5% идентичность с последовательностью SEQ ID NO: 2.

3. Белок по п.1, который имеет последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 12.

4. Белок по п.1, в котором по меньшей мере одна мутация является мутацией, выбранной из предпочтительных, наиболее предпочтительных или альтернативных замен, показанных в табл. 3.

5. Белок по п.1, в котором по меньшей мере одна мутация является мутацией, выбранной из предпочтительных, наиболее предпочтительных или альтернативных замен, показанных в табл. 4.


6. Нуклеиновая кислота, кодирующая белок по любому из пп.1-5.

7. Вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п.6.


8. Микроорганизм, содержащий вектор по п.7.

9. Композиция для осахаривания лигноцеллюлозы, содержащая белок по любому из пп.1-5 и один или несколько ферментов, выбранных из целлюлаз, гемицеллюлаз и пектиназ.


10. Применение белка по любому из пп.1-5 для осахаривания лигноцеллюлозы.




Фиг. 1




Фиг. 2




Фиг. 3



Фиг. 4



Фиг. 5



Фиг. 6



Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2