(19)

**Евразийское
патентное
ведомство**

(11) **034183**(13) **B1**(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ**

(45) Дата публикации и выдачи патента
2020.01.15

(21) Номер заявки
201700193

(22) Дата подачи заявки
2017.03.21

(51) Int. Cl. *C12G 3/02* (2006.01)
A23L 2/84 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/72 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)

(54) **СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА БРОЖЕНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОКА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ ИЛИ КЛЮКВЫ**

(43) **2018.09.28**

(96) **2017/EA/0010 (BY) 2017.03.21**

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"МОГИЛЕВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ" (BY)**

(72) Изобретатель:
Цед Елена Алексеевна (BY)

(56) **BY-C1-8026**

Зинцова Ю.С. Разработка технологии производства ферментированного напитка на основе плодово-ягодного сырья Алтайского края и поликультуры *Oryzomyces Indici*, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Красноярск, 2015, с. 3-20

Цед Е.А. и др. Новый ферментированный безалкогольный напиток на основе рисового гриба *Oryzomyces indicis* РГЦ. Журнал "Пиво и напитки", № 2, 2007, с. 48-50

SU-A1-1517914

Кишковский З.Н. и др. Технология вина. Москва, "Легкая и пищевая промышленность", 1984, с. 363, 373-374

(57) Изобретение относится к безалкогольной промышленности, в частности к производству сброженных безалкогольных напитков. Готовят сахарный сироп концентрацией сухих веществ 60-65 мас.% путем растворения расчетного количества сахара в предварительно подогретой до 50°C воде с последующим кипячением в течение 30 мин. Пастеризованную воду готовят путем ее нагрева до 90°C в течение 20 мин. Сусло получают разбавлением расчетного количества сахарного сиропа пастеризованной водой до концентрации сухих веществ 3,0 мас.% и вносят сок красной смородины в количестве 2 об.%, вводят предварительно хорошо промытый виноград сушеный кишмишных сортов в количестве 4 г/дм³, вносят *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм³ сусла. Сбраживание длится 48 ч при температуре 30°C. После этого сброженное сусло отделяют от винограда сушеного, охлаждают до температуры 12°C, удаляют *Oryzomyces indicis* РГЦ. Затем проводят купажирование напитка сахарным сиропом и соком красной смородины в количестве 5 об.% до концентрации сухих веществ в готовом напитке 7,8-8,2% или соком клюквы в количестве 4 об.% и сахарным сиропом до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,0-8,4%. После чего фильтруют, пастеризуют при температуре 100°C в течение 10 мин и осуществляют розлив. Улучшены органолептические, физико-химические показатели качества напитка и повышено содержание в нем биологически активных ценных веществ естественного происхождения.

B1**034183****034183****B1**

Изобретение относится к безалкогольной промышленности, в частности к производству сброженных безалкогольных напитков.

Известен способ получения сброженного безалкогольного напитка [1], предусматривающий приготовление сахарного сиропа с последующим его разбавлением пастеризационной водой, внесение изюма, сбраживание полученного суслу закваской жидкой *Oryzomyces indicis* РГЦ с тривиальным названием рисовый грибок, охлаждение его, отделение от осадка, купажирование напитка сахарным сиропом и розлив.

Недостатком способа является недостаточные органолептические свойства готового напитка, представляющего собой замутненную жидкость белого цвета со специфическим ароматом используемой закваски жидкой *Oryzomyces indicis* РГЦ.

Задачей изобретения является улучшение органолептических свойств готового напитка и повышение его качества.

Технический результат достигается тем, что в способе получения сброженного безалкогольного напитка брожения, предусматривающем приготовление сахарного сиропа с последующим его разбавлением пастеризованной водой, внесением винограда сушеного, сбраживание полученного суслу закваской жидкой *Oryzomyces indicis* РГЦ, охлаждение суслу, отделение от осадка, купажирование напитка сахарным сиропом, фильтрация, пастеризация и розлив, при сбраживании в суслу вносят сок красной смородины в количестве 2 об.%, а при купажировании в сброженное суслу вносят сок красной смородины в количестве 5 об.% и сахарный сироп до концентрации сухих веществ в готовом напитке 7,8-8,2% или сок клюквы в количестве 4 об.% и сахарный сироп до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,0-8,4%, после чего полученный напиток фильтруют и пастеризуют при температуре 100°C в течение 10 мин.

Благодаря внесению сока красной смородины в суслу на стадии сбраживания наблюдается интенсификация процессов брожения за счет стимулирующего действия сока красной смородины на жизнедеятельность биоккультуры *Oryzomyces indicis* РГЦ, о чем свидетельствует характер его обмена веществ. Использование же соков красной смородины или клюквы при купажировании напитка позволяет не только получать напиток с определенными "благородными" органолептическими свойствами и внешним видом, но и дает возможность обогатить продукт дополнительным количеством ценных биологически активных веществ, содержащихся в используемом фруктовом сырье.

Способ осуществляют следующим образом.

Приготавливают сахарный сироп с концентрацией сухих веществ 60-65 мас.%. Для этого в предварительно нагретую до 50°C воду задают расчетное количество сахара и непрерывно перемешивают до его полного растворения. После этого температуру постепенно повышают до 100°C, после чего нагрев прекращают и снимают пену. Такая операция повторяется дважды. С целью предотвращения развития слизеобразующих микроорганизмов кипячение сахарного сиропа производят в течение 30 мин. По достижении концентрации сиропа 60-65% варку прекращают. Сироп в горячем состоянии подают на фильтрацию, а затем направляют на охлаждение. Охлажденный до 10-20°C сахарный сироп передают насосом в закрытые сборники для хранения сахарного сиропа.

Пастеризованную воду готовят путем ее нагрева до 90°C в течение 20 мин для исключения попадания в суслу посторонних микроорганизмов.

Производят разбавление расчетного количества сахарного сиропа пастеризованной водой таким образом, чтобы концентрация сухих веществ в сусле была 3,0 мас.%. Затем вносят натуральный сок красной смородины в количестве 1-3 об.% и тщательно перемешивают. Для активизации метаболизма *Oryzomyces indicis* РГЦ в суслу задают предварительно вымытый и ошпаренный горячей (температурой 100°C) водой виноград сушеный кишмишных сортов в количестве 4 г/дм³.

В охлажденное до температуры брожения 30°C суслу вносят закваску жидкую *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм³.

Брожение суслу проводят при температуре 30°C в течение 48 ч.

По окончании брожения сброженное суслу отделяют от винограда сушеного, охлаждают до температуры 12°C, а затем перекачивают в купажную емкость.

Купажирование сброженного суслу проводят путем внесения в него расчетных количеств сахарного сиропа и сока красной смородины в количестве 4-6 об.% до концентрации сухих веществ в готовом напитке 7,8-8,2% или сока клюквы в количестве 3-5 об.% до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,0-8,4%, а затем тщательно перемешивают.

Для повышения биологической и физико-химической стойкости готового напитка проводят его фильтрацию с использованием фильтр-пресса или обеспложивающего фильтра.

Для повышения биологической стойкости готового напитка проводят его пастеризацию при температуре 100°C в течение 10 мин и затем осуществляют розлив.

Готовый сброженный безалкогольный напиток представляет собой напиток розового цвета с кислото-сладким вкусом и в случае применения сока красной смородины - ароматом красной смородины, в случае применения сока клюквы - ароматом клюквы.

Пример 1.

Готовят суслу путем смешивания расчетных количеств пастеризованной при 90°C воды, сахарного сиропа с концентрацией 62 мас.% сухих веществ и сока красной смородины в количестве 1% до концен-

трации сухих веществ в готовом сусле 3,1 мас. %.

Затем вносят предварительно хорошо промытый виноград сушеный кишмишных сортов в количестве 4 г/дм³, и *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм³.

Брожение суслу длится при температуре 30°C в течение 48 ч.

После этого сброженное сусле отделяют от винограда сушеного, охлаждают до температуры 12°C, отделяют от *Oryzomyces indicis* РГЦ и проводят купажирование напитка сахарным сиропом и соком красной смородины в количестве 4 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 7,8% или сока клюквы в количестве 3 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,0%, а затем тщательно перемешивают, фильтруют, пастеризуют и осуществляют розлив.

Готовый напиток имеет розовый цвет с кисловато-сладким вкусом и ароматом, в случае применения сока красной смородины - со слабыми нотами красной смородины, в случае применения сока клюквы - со слабыми нотами аромата клюквы.

Пример 2.

Готовят сусле путем смешивания расчетных количеств пастеризованной при 90°C воды, сахарного сиропа концентрацией 62 мас. % сухих веществ и сока красной смородины в количестве 2% до концентрации сухих веществ в готовом сусле 3,2 мас. %.

Затем вносят предварительно хорошо промытый виноград сушеный кишмишных сортов в количестве 4 г/дм³ и *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм³.

Брожение суслу длится при температуре 30°C в течение 48 ч.

После этого сброженное сусле отделяют от винограда сушеного, охлаждают до температуры 12°C, отделяют от *Oryzomyces indicis* РГЦ и проводят купажирование напитка сахарным сиропом и соком красной смородины в количестве 5 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,0% или сока клюквы в количестве 4 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,2%, а затем тщательно перемешивают, фильтруют, пастеризуют и осуществляют розлив.

Готовый напиток характеризуется насыщенным ярко-розовым цветом кисло-сладким вкусом и приятным ароматом, в случае применения сока красной смородины - красной смородины, в случае применения сока клюквы - клюквы.

Пример 3.

Готовят сусле путем смешивания расчетных количеств пастеризованной при 90°C воды, сахарного сиропа концентрацией 62 мас. % сухих веществ и сока красной смородины в количестве 3% до концентрации сухих веществ в готовом сусле 3,4 мас. %.

Затем вносят предварительно хорошо промытый виноград сушеный кишмишных сортов в количестве 4 г/дм³ и *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм³.

Брожение суслу длится при температуре 30°C в течение 48 ч.

После этого сброженное сусле отделяют от винограда сушеного, охлаждают до температуры 12°C, отделяют от *Oryzomyces indicis* РГЦ и проводят купажирование напитка сахарным сиропом и соком красной смородины в количестве 6 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,2% или сока клюквы в количестве 5 об. % до концентрации сухих веществ в готовом напитке 8,4%, а затем тщательно перемешивают, фильтруют, пастеризуют и осуществляют розлив.

Готовый напиток характеризуется интенсивным розовым цветом с кисло-сладким вкусом и в случае применения сока красной смородины - ярко выраженным ароматом красной смородины, в случае применения сока клюквы - ярко выраженным ароматом клюквы.

Данные по качеству сброженного безалкогольного напитка по предлагаемому способу и прототипу представлены в таблице.

Физико-химические показатели качества сброженного безалкогольного напитка брожения с добавлением сока красной смородины или клюквы

Способ получения безалкогольного напитка брожения	Время брожения, ч	Массовая доля сухих веществ, % масс	Кислотность, см ³ 1 моль/дм ³ р-ра NaOH на 100 см ³ напитка	Суммарное содержание витаминов, мг/100 г	Суммарное содержание аминокислот, мг/100 см ³	Содержание карбонильных соединений, г/100 см ³ напитка
Прототип	48	6,2	2,0	2,1	231,0	0,176
Предлагаемый способ						
Пример 1	48	7,8-8,0	2,2-2,4	8,45-10,21	612,2-551,8	0,192-0,234
Пример 2	48	8,0-8,2	2,4-2,6	10,11-13,84	689,1-632,0	0,217-0,298
Пример 3	48	8,2-8,4	2,5-2,9	12,33-15,76	697,5-678,9	0,278-0,342

Как видно из таблицы, качество полученного по предлагаемому способу сброженного безалкогольного напитка и его органолептические свойства существенно повысились: напиток приобрел красивый насыщенный розовый цвет, благоприятное сочетание аромата красной смородины (или клюквы) и *Oryzomyces indicis* РГЦ, в нем содержится повышенное количество биологически активных ценных веществ и, в частности, витаминов, аминокислот, органических кислот, карбонильных соединений и т.д., что выгодно отличает его от прототипа.

Приготовление безалкогольного напитка брожения по предлагаемому способу дает возможность получать напиток с наиболее слаженной ароматической и вкусовой гаммой, чему соответствует содержащаяся в напитке необходимая кислотность $2,2\text{-}2,9 \text{ см}^3 \text{ l моль/дм}^3$ р-ра NaOH на 100 см^3 напитка, и наибольшее содержание биологически активных ценных веществ. Такое значительное повышение биологически активных ценных веществ происходит за счет внесения сока красной смородины или сока клюквы, содержащих в своем составе указанные вещества.

Источник информации.

1. Патент № 8026 "Способ производства сброженного безалкогольного напитка".

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения безалкогольного напитка брожения с добавлением сока красной смородины или клюквы, заключающийся в том, что приготавливают сахарный сироп и разбавляют его пастеризованной водой до концентрации сухих веществ в $3,0 \text{ мас.}\%$, добавляют к нему сок красной смородины в количестве $2 \text{ об.}\%$ и сушеный виноград в количестве 4 г/дм^3 , охлаждают полученное сусло до 30°C , вносят в него жидкую закваску *Oryzomyces indicis* РГЦ в количестве 60 г/дм^3 и сбраживают в течение 48 ч, после чего полученный напиток отделяют от осадка, охлаждают до 12°C , добавляют в него сок красной смородины в количестве $5 \text{ об.}\%$ и сахарный сироп до концентрации сухих веществ в готовом напитке $7,8\text{-}8,2\%$ или сок клюквы в количестве $4 \text{ об.}\%$ и сахарный сироп до концентрации сухих веществ в готовом напитке $8,0\text{-}8,4\%$, после чего полученный напиток фильтруют и пастеризуют при температуре 100°C в течение 10 мин.

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2