

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА , ОПУБЛИКОВАННАЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (PCT)

(19) Всемирная Организация
Интеллектуальной Собственности
Международное бюро



(10) Номер международной публикации

WO 2019/004877 A 1

(43) Дата международной публикации
03 января 2019 (03.01.2019)

WIPO IPCT

- (51) Международная патентная классификация :
Л 61К 9/10 (2006.01) А 61К 31/095 (2006.01)
А 61К 9/107 (2006.01) А 61К 47/69 (2017.01)
А 61К 9/20 (2006.01) А 61К 47/40 (2006.01)
А 61К 9/48 (2006.01) А 61П 15/08 (2006.01)
А 61К 9/08 (2006.01)
- (21) Номер международной заявки : PCT/RU20 18/050068
- (22) Дата международной подачи :
27 июня 2018 (27.06.2018)
- (25) Язык подачи : Русский
- (26) Язык публикации : Русский
- (30) Данные о приоритете :
2017122775 28 июня 2017 (28.06.2017) RU
- (72) Изобретатель ; и
- (71) Заявитель : РОЗИЕВ , Рахимджан Ахметджано -
вич (**ROZIEV, Rakhimdzhан Akhmetdzhанovich**)
[RU/RU]; ул. Энгельса , д. 23, кв. 12, к. 3, Обнинск , Ка-
лужская обл., 249039, Obninsk, Kaluzhskaya obi. (RU).
- (72) Изобретатели : ЕРИМБЕТОВ , Кенес Тагаевич
(**ERIMBETOV, Kenes Tagaevich**); ул. Поселок Ин-
ститута , д. 6, кв. 62, Боровск , Калужская обл.,
249013, Borovsk, Kaluzhskaya obi. (RU). БОНДА -
ПЕНКО, Екатерина Валерьевна (**BONDARENKO,**
Ekaterina Valerevna); ул. Гагарина , д. 35, кв. 4, Балаба-
ново , Калужская обл., 249000, Balabanovo, Kaluzhskaya
obi, (RU). КАПАШНИКОВА , Елена Евгеньевна
(**KALASHNIKOVA, Elena Evgenevna**); ул. Долгинин -
ская , д. 4, кв. 111, Обнинск , Калужская обл., 249030,
Obninsk, Kaluzhskaya obi. (RU). ГОНЧАРОВА , Анна
Яковлевна (**GONCHAROVA, Anna Yakovlevna**); пр-
кт Ленина , д. 210, кв. 60, Обнинск , Калужская обл.,
249034, Obninsk, Kaluzhskaya Obi. (RU).
- (74) Агент : ЧАБАНЬ , Юлия Михайловна (**CHABAN,**
Julia Mikhajlovna); а/я 9004, Обнинск , Калужская обл.,
249039, Obninsk, Kaluzhskaya obi. (RU).
- (81) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида национальной охраны) : А Е, А G, А L, А M,
А О, А T, А U, А Z, В А, В B, В G, В H, В N, В R, В W, В Y, В Z,
С А, С H, С L, С N, С O, С R, С U, С Z, D E, D J, D K, D M, D O,
D Z, E C, E E, E G, E S, F I, G B, G D, G E, G H, G M, G T, H N,
H R, H U, I D, I L, I N, I R, I S, J O, J P, K E, K G, K H, K N, K P,
K R, K W, K Z, L A, L C, L K, L R, L S, L U, L Y, M A, M D, M E,
M G, M K, M N, M W, M X, M Y, M Z, N A, N G, N I, N O, N Z,
O M, P A, P E, P G, P H, P L, P T, Q A, R O, R S, R U, R W, S A,
S C, S D, S E, S G, S K, S L, S M, S T, S V, S Y, T H, T J, T M, T N,
T R, T T, T Z, U A, U G, U S, U Z, V C, V N, Z A, Z M, Z W.
- (84) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида региональной охраны) : ARIPO (B W, G H,
G M, K E, L R, L S, M W, M Z, N A, R W, S D, S L, S T, S Z, T Z,
U G, Z M, Z W), евразийский (A M, A Z, B Y, K G, K Z, R U,
T J, T M), европейский патент (A L, A T, B E, B G, С H, С Y,
С Z, D E, D K, E E, E S, F I, F R, G B, G R, H R, H U, I E, I S, I T,
L T, L U, L V, M C, M K, M T, N L, N O, P L, P T, R O, R S, S E,
S I, S K, S M, T R), OAPI (B F, B J, С F, С G, С I, С M, G A, G N,
G Q, G W, K M, M L, M R, N E, S N, T D, T G).
- Декларации в соответствии с правилом 4.17:
— касающаяся права заявителя надавать заявку на
патент и получать его (правило 4.1 7 (ii))
- Опубликована :
— с отчётом о международном поиске (статья 21.3)
— до истечения срока для изменения формулы
изобретения и с повторной публикацией в случае
получения изменений (правило 48.2(h))
— с информацией о включении путём ссылки
отсутствующих частей и/или элементов (правило
20.6)

(54) Title: AGENT FOR TREATING FEMALE INFERTILITY AND INFERTILITY IN FEMALE ANIMALS

(54) Название изобретения : СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ И БЕСПЛОДИЯ САМОК ЖИВОТНЫХ

(57) Abstract: The group of inventions relates to medicine and veterinary science, and more particularly to medical and veterinary gynaecology. Proposed is the use of 9-phenyl-sym-octahydroselenoxanthene as an agent for treating female infertility and infertility in female animals, which stimulates folliculogenesis and promotes embryo implantation in the uterine endometrium. Also proposed is a medicinal preparation and a pharmaceutical composition which contain 9-phenyl-sym-octahydroselenoxanthene as an active ingredient. The invention broadens the range of agents for boosting fertility by non-hormonal stimulation of folliculogenesis.

(57) Реферат : Группа изобретений относится к медицине и ветеринарии , а именно к медицинской и ветеринарной гинеко -
логии . Предлагается применение 9-фенил-симм -октагидроселено -ксантена в качестве средства для лечения женского беспло -
дия и бесплодия самок животных , стимулирующего фолликулогенез и способствующего имплантации эмбрионов в эндомет -
рий матки . Предлагается также лекарственный препарат и фармацевтическая композиция , включающие в качестве активно -
го компонента 9-фенил-симм -октагидроселено -ксантен . Изобретение расширяет арсенал средств , способствует увеличению
фертильности за счет негормонального стимулирования фолликулогенеза .



WO 2019/004877 A1

Средство для лечения женского бесплодия и бесплодия самок животных

Группа изобретений относится к медицине и ветеринарии, а именно к медицинской и ветеринарной гинекологии, и может быть использовано для лечения женского бесплодия и бесплодия самок животных (далее для лечения женского бесплодия).

Примерно в 40% случаев неспособность супружеских пар зачать ребенка обусловлена бесплодием женщины. Основная причина женского бесплодия связана с нарушением фолликулогенеза.

Рост фолликулов в женском организме осуществляется в несколько этапов. В составе яичников по морфологическим признакам выделяют четыре типа фолликулов: примордиальные, первичные (преантральные), вторичные (антральные) третичные (предовуляторные). К периоду достижения половой зрелости основным типом фолликулов являются примордиальные, представляющие собой ооцит, окруженный одним неполным слоем плоских клеток, предшественников гранул езы. Примордиальные фолликулы образуются еще до рождения ребенка. Они формируются в процессе пролиферации первичных зародышевых клеток в зародышевом яичнике на ранней стадии беременности. В течение жизни женщины 400-500 примордиальных фолликулов могут дойти до стадии овуляции, остальные из 200-450 тысяч фолликулов подвергаются атрезии. Редуцирование фолликулов посредством апоптоза может начаться на любой стадии их развития (Боярский К.Ю., Гайдуков С.Н. Молекулярные основы фолликулогенеза: от стадии больших антральных фолликулов до овуляции // Проблемы репродукции - 2010 - 5 - стр. 13-22). В процессе фолликулогенеза из примордиального образуется первичный фолликул, который представляет собой ооцит, окруженный одним полным слоем гранулезы. Факторы, обеспечивающие выход фолликулов из примордиального состояния неизвестны, но их рост на этой стадии при отсутствии развитой сети кровеносных сосудов в зоне роста не зависит от циркулирующих в крови

гормонов и потому является гормонально -нечувствительным . В этот период рост фолликулов регулируется местными факторами . При этом ооцит играет ведущую роль в регуляции перехода от стадии примордиального фолликула к стадии первичного . Для такого перехода необходима экспрессия ооцитом факторов РФД -9 (ростового фактора дифференцировки 9-го типа (CDF-9) и костного морфогенетического фактора роста 15-го типа КМФ -15 (BMP -15)).

При переходе примордиальных фолликулов в первичные увеличиваются размеры ооцита , фолликулярные клетки , окружающие ооцит , пролиферируют , увеличивается их число и размеры , однослойный эпителий становится многослойным . Скорость выхода фолликула из примордиального пула в течение жизни изменяется , увеличиваясь в постнатальном онтогенезе .

По мере увеличения растущего фолликула , окружающая его соединительная ткань уплотняется , давая начало образования внешней оболочке , так называемой теке . Эта стадия роста проходит в аваскулярной зоне яичника в условиях отсутствия гипофизарных гонад отропинов .

Переход фолликула в следующую фазу вторичного фолликула характеризуется значительным увеличением размеров ооцита и числа клеток гранулезы . Эта стадия роста фолликулов может проходить только в присутствии базальных уровней гипофизарных гонадотропинов , в первую очередь фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) . На этой стадии развития фолликула на клетках гранулезы выявляются рецепторы для ФСГ , а на клетках формирующейся теки обнаруживаются рецепторы для лютеинизирующего гормона (ЛГ) (Боярский К.Ю ., Гайдуков С.Н ., Чинчаладзе А.С. Факторы , определяющие овариальный резерв женщины // Журнал акушерства и женских болезней . - 2009 - т.58 - №2 - стр . 65-71). В стадии вторичного фолликула тека разделяется на внутреннюю и наружную части . В фолликуле образуется полость с фолликулярной жидкостью , которая содержит стероидные гормоны (эстрогены) , гипофизарные гонадотропные факторы роста , ферменты , протеогликаны и другие биологически активные вещества , синтезируемые как местно в клетках

гранулезы , теке и ооците , так и поступающих из кровотока . Во внутренней теке происходят процессы , обеспечивающие нейротрофику . В многослойном фолликулярном эпителии обособлена область , несущая половую клетку яйценосный бугорок .

Третий период роста фолликулогенеза является гормонально - зависимым . Третичные фолликулы (граафовы пузырьки) достигают своего максимального развития и характеризуются подготовкой фолликула к овуляции . Фолликул приобретает крупные формы , большую полость , заполненную жидкостью . Стенки фолликула истончаются . Клетки фолликулярного эпителия и теки интенсивно синтезируют половые гормоны , главным образом эстрадиол .

Эстрадиол необходим для осуществления процессов овуляции , а также для того , чтобы обеспечить пролиферацию клеток эндометрия . Повышенное содержание эстрадиола стимулирует выброс ЛГ , который и инициирует овуляцию . В стенке фолликула образуется выпячивание , которое разрывается и яйцеклетка выходит из фолликула . После овуляции на месте фолликула из гранулезы образуется желтое тело , вырабатывающее прогестерон .

Нарушение нормального фолликулогенеза может привести к снижению репродуктивного потенциала женщины . Применение гормональных средств влияет только на гормонозависимые стадии фолликулогенеза в то время как на начальные гормононезависимые этапы гормональные препараты не действуют .

Известно , что для стимуляции роста и созревания ооцитов на ранних стадиях предлагается использовать ростовой фактор дифференцировки 9-го типа (РФД -9, CDP-9, патент US6660717 / А 61Р 15/08, опубл . 09.12.2003). Применение указанного фактора , как полагают авторы , обеспечивает эффективное развитие и созревание фолликулов и ооцитов и получение гамет «высокого качества » , необходимых для рождения здорового потомства . Помимо фактора РФД -9 предлагаемое средство рекомендуется дополнять гонадотропинами , в частности ФСГ . Недостатком указанного средства

является его полипептидная природа . Для получения РФД -9 требуется использование трудозатратной рекомбинантной технологии . Кроме того применение гормональных средств может нарушить синтез эндогенных гормонов .

Технической проблемой , на решение которой направлено заявляемое изобретение , является расширение арсенала средств , предназначенных для лечения женского бесплодия , для увеличения фертильности за счет негормонального стимулирования фолликулогенеза . Технический результат заключается в реализации предлагаемых средств , обеспечивающих лечение женского бесплодия за счет негормонального стимулирования фолликулогенеза , в улучшении качества гамет и появлении жизнестойкого потомства .

Для решения поставленной технической проблемы и достижения максимально возможного результата в настоящем изобретении предлагается применение 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантена в качестве средства для лечения женского бесплодия , стимулирующего фолликулогенез и способствующего имплантации эмбрионов в эндометрий матки .

Предлагается лекарственный препарат для лечения женского бесплодия , который содержит в качестве активного компонента 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен в эффективном количестве или может содержать дополнительно β -цикло декстрин в соотношениях от 1:1 - до 1:10.

Активный компонент лекарственного препарата для лечения женского бесплодия 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен может быть представлен в виде клатратного комплекса с β -цикл одекстрином .

Фармацевтическая композиция для лечения женского бесплодия в качестве активного компонента содержит 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен или может дополнительно содержать β -циклодекстрин , либо 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен может быть представлен в виде клатратного комплекса с β -цикл одекстрином .

Указанная фармацевтическая композиция может применяться в форме таблеток, с содержанием 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена от 5 до 30%, а остальное - один или более наполнитель (и). При этом таблетки сформированы посредством прессовки или формовки.

Либо фармацевтическая композиция применяется в форме желатиновых капсул, при следующем соотношении компонентов:

- 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен от 1 до 20%;
- наполнитель (и) или носитель (и) остальное.

Фармацевтическая композиция может быть выполнена в виде растворов, эмульсий, суспензий и др., с содержанием 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена от 0,25 до 2%; остальное - наполнитель (и) или носитель (и).

Предлагаемое изобретение предлагается использовать в качестве средств для лечения женского бесплодия, увеличивающих фертильность, стимулирующих фолликулогенез, а также способствующих имплантации эмбрионов в эндометрий матки. Предлагаемое средство обеспечивает улучшение качества гамет и появление жизнестойкого потомства.

Сущность изобретения поясняется примерами конкретного выполнения, в которых:

Препарат 1 - это фармацевтическая субстанция (ФС) с содержанием соединения 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен выше мас.99%

Препарат 2 - смесь соединения 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен с β -циклодекстрином в соотношениях: от 2 мг до 10 мг 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена и от 188 мг до 180 мг β -циклодекстрина, соответственно.

Препарат 3 - клатратный комплекс β -циклодекстрина с 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантеном в соотношении 10:1, полученный стандартным способом /патент RU245 1680, C07D 345/00, опубл. 27.05.2012 г./.

Стимулирование фолликулогенеза у самок мышей линии BALB/c LacY и улучшение их репродуктивных функций под влиянием заявляемых средств для лечения женского бесплодия и увеличения фертильности

продемонстрировано в двух независимых экспериментах . В настоящем изобретении , если не указано иное , концентрации представлены в мас .%.

Пример 1. Целью изучения влияния исследуемых препаратов на репродуктивные функции самок млекопитающих (на примере мышей линии BALB/c LacY)» является оценка их способности влиять на содержание ранних (примордиальных и первичных) и апоптотических фолликулов в яичниках инбредных мышей линии BALB/c LacY после 4 недель их внутрижелудочного введения .

В работе использовали самок инбредных мышей линии BALB/c LacY, которые отличаются низкой плодовитостью . Дефект репродуктивной функции самок связан с высокой эмбриональной смертностью . Потери эмбрионов до имплантации составляют до 39,5 %; общие эмбриональные потери от числа желтых тел - до 49,4 % . В связи с этим мыши этой линии являются удобным объектом для оценки способности исследуемых препаратов влиять на репродуктивную функцию самок .

В эксперименте были использованы 20 половозрелых самок мышей с исходной массой 20-22 г . В начале эксперимента животные были разделены на 4 группы - контроль и 3 опытных по 5 особей в каждой . Поскольку при клиническом применении предполагается пероральный путь введения исследуемых препаратов , животным опытных групп средства вводили ежедневно интрагастрально в виде суспензии с водой , приготовленной *ex tempore*. Предлагаемые препараты вводили в течение 4 недель в дозе 0,4 мг на кг массы тела мышей по действующему веществу (9-фенил -симм -октагидроселено -ксантену). Животным контрольной группы в те же сроки ежедневно интрагастрально в виде суспензии с водой вводили соответствующие количества β -циклодекстрина .

В течение опыта ежедневно контролировали состояние животных и в начале и конце экспериментального периода проводили измерение их массы

тела . В конце эксперимента мышей подвергали эвтаназии в CO_2 - камере , проводили аутопсию и выделяли яичники .

Использование замороженных гистологических срезов яичников млекопитающих , в отличие от других методов научного исследования , предоставляет уникальную возможность для изучения функционального состояния и развития женских половых клеток (ооцитов) , а также других клеток , участвующих в этом процессе (таких как клетки гранулезы) . В отличие от широко используемого пункционного метода выделения ооцитов из яичника , предлагаемый в настоящей работе подход позволяет исследовать женские половые клетки на ранних стадиях развития . Использование же парафиновых гистологических срезов яичников , предварительно обработанных различными видами фиксаторов , не позволяет в полной мере оценить состояние исследуемых клеток из-за эффекта маскирования некоторых антигенов , а также невозможности применения высокоинформативного метода иммунофлуоресценции .

Для извлечения яичников самку умерщвляют , кладут на живот и делают короткий разрез в дорзо -вентральном направлении слева или справа на 5 мм каудальнее нижних ребер (разрезают кожу и стенку брюшной полости) . Пинцетом захватывают подушку сальника и вытаскивают наружу вместе с яичником , яйцеводом и верхним отделом матки . Под контролем стереомикроскопа (бинокляра) , используя микропинцет и маленькие ножницы , отделяют яичник от яйцевода , матки и жировой ткани . Яичник мыши имеет размер порядка 1-2 мм с заметными преовуляторными фолликулами величиной порядка 300-500 мкм . Затем извлеченный яичник помещали в специальную форму и заливали в блоки при помощи замораживающего средства Neg-50 Frozen Section Medium (Richard-Allan Scientific, USA), имеющего в своем составе поливиниловый спирт и полиэтиленгликоль , и замораживали при $-20^{\circ}C$. Данное средство препятствует образованию "кубического " льда и помогает замороженной ткани сохранять нативную структуру . Замораживающее средство является

водорастворимым и никак не сказывается на фоновом окрашивании препарата. Затем готовые блоки монтировали на предметные столики криотома с использованием того же средства и изготавливали криосрезы.

Для изготовления замороженных срезов использовали специальный прибор микротом -криостат MICROM HM 525 (Thermo Scientific, Germany), позволяющий получать срезы толщиной в диапазоне от 2 до 500 мкм. Прибор имеет модульную конструкцию с открывающейся вверх рабочей поверхностью и охлаждающую камеру из нержавеющей стали. Температура камеры регулируется от +5 °C до -30 °C. Оптимальная температура для производства срезов зависит от соответствующих свойств ткани, особенно от содержания жира. Учитывая предварительную очистку яичников от жира и тот факт, что яичники являются органами с небольшим его содержанием, нами была выбрана оптимальная температура для производства срезов -20°C.

Замороженный блок закрепляли на держателе образца, с помощью соответствующих кнопок на панели управления выбирали необходимую толщину срезов (5 мкм) и изготавливали срезы путем поворота маховика по часовой стрелке. При этом полученный срез сдвигается в щель между верхней стороной ножа и антироллерной пластиной, откуда, откинув антироллер, срез можно перенести на подготовленное чистое предметное стекло (Superfrost Plus Gold Adhesion Slides, Fisher Scientific, Germany), используя кисточку или производя отпечаток. Электростатическое покрытие этих стекол обеспечивает высокую адгезию замороженных срезов ткани, позволяя сохранить срезы на стеклах в процессе окрашивания препаратов, а также избежать образования артефактов из-за способности данных предметных стекол иммобилизовывать ядерные и цитоплазматические компоненты тканей.

Предметные стекла с прикрепленными срезами хранили при -80 °C до момента использования.

Для изучения препаратов криосрезов яичников использовали флуоресцентный микроскоп Axiovert 200 (Carl Zeiss, Germany), используя

объектив Plan-NEOFLUAR 40x/0,75 и соответствующие наборы фильтров .
Изображения записывали с помощью 13-битной монохромной камеры CoolSnapcf (RoperScientific, USA).

Подсчет фолликулов производили на криосрезах яичников животных контрольной и опытных групп после иммуногистохимического окрашивания .
Количество проанализированных криосрезов зависело от индивидуального размера органа и состояния ткани после замораживания . Учитывались только тщательно расплавленные срезы , с ровными краями и равномерно прокрашенные по всей площади среза .

Для статистической обработки посчитано среднее количество фолликулов (M) на срез для каждой мыши и затем для каждой группы . Для полученных значений контрольной и опытных групп (из 5 мышей каждая) найдена стандартная ошибка (τ) . Достоверность различий между группами оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента .

Идентификацию ранних фолликулов в яичниках проводили после окрашивания криосрезам хроматиновым красителем DAPI и кроличьими моноклональными антителами к белку фибрилларину . Фибрилларин (34-36 кДа) является основным белковым компонентом U3, U8 и U13 малых ядрышковых рибонуклеопротеиновых гранул (мякРНП) и локализуется в фибриллярном центре и плотном фибриллярном компоненте ядрышка . Фибрилларин обладает высокой степенью эволюционной консервативности и его основные функции связаны с процессингом пре-рибосомальной РНК (пре-рРНК) и ее химическими модификациями . Белок содержит три основных структурных домена , включая GAR домен , обогащенный остатками глицина и аргинина , РНК -связывающий домен и область с доминирующей α -спиральной вторичной структурой , обладающей метилтрансферазной активностью . Таким образом , фибрилларин является РНК -связывающим белком ядрышка , участвующим в ранних стадиях процессинга рибосомальной РНК (рРНК) .

Показано , что количественное содержание фибрилларина коррелирует с транскрипционной активностью РНК -полимеразы , скоростью клеточного деления и размером ядрышек , что говорит о том , что иммуноцитохимическое выявление этого белка может быть использовано для оценки общего уровня клеточного метаболизма .

Иммуногистохимическое окрашивание ткани яичников является маркерной реакцией , позволяющей выявлять на криосрезях ооциты различной степени зрелости . Размер ядрышек ооцитов , выявляемых антителами к фибрилларину , сильно превышает таковой у гранулезных , стромальных и других окружающих клеток . В ооцитах в составе примордиальных и первичных фолликулов выявляется , как правило , два ядрышка . Их размер приближается к 5 мкм , что в сочетании со специфической морфологией данных типов фолликулов позволяет безошибочно их идентифицировать (фиг . 1 и 2).

Нами было проанализировано от 23 до 58 криосрезев яичников от каждого животного контрольной и опытных групп . Результаты подсчета количества примордиальных и первичных фолликулов представлены в табл . 2 и на фиг . 1, 2. Динамика изменения массы тела подопытных мышей приведена в табл . 1.

Таблица 1 - Динамика изменения массы тела мышей при месячном внутрижелудочном введении предлагаемых препаратов

Группы животных	Периоды наблюдения	
	До введения препаратов	Через 4 недели (после курса введения препаратов)
Препарат 1	20,4±0,12	21,9±0,18
Препарат 2	20,3±0,23	22,0±0,19
Препарат 3	20,1±0,10	22,4±0,20
Контроль	20,8±0,21	21,7±0,19

Таблица 2 - Количество примордиальных и первичных фолликулов

Группы	Номера мышей	Количество срезов	Количество фолликулов на срез, М±m
Препарат 1	1	44	8,23±0,35
	2	23	4,98±0,51
	3	37	2,11±0,22
	4	34	6,02±0,28
	5	41	4,24±0,19
Всего на группу:		179	5,12±0,20*
Препарат 2	6	31	6,32±0,22
	7	49	5,61±0,65
	8	36	3,41±0,51
	9	35	2,52±0,34
	10	40	7,05±0,25
Всего на группу:		191	4,94±0,29*
Препарат 3	11	48	1,25±0,28
	12	28	5,61±0,65
	13	41	8,56±0,51
	14	30	6,20±0,39
	15	39	2,03±0,19
Всего на группу:		186	4,76±0,35*
Контроль	16	58	2,84±0,30
	17	52	7,40±0,41
	18	50	11,08±0,55
	19	41	3,41±0,36
	20	40	4,85±0,36
Всего на группу:		241	5,97±0,27
<u>Примечание :</u>			
*Отличия от группы контроля достоверны по t-критерию , p<0,05			

Статистическая обработка полученных результатов показала , что количество примордиальных и первичных фолликулов достоверно меньше у мышей , получавших исследуемые препараты по сравнению с контролем . Полученный результат может свидетельствовать о том , что предлагаемые препараты стимулируют фолликулогенез , и к моменту приготовления срезов яичников большая часть созревающих фолликулов уже прошла стадию первичных фолликулов и достигла более поздних стадий развития , не учитываемых в данном эксперименте .

Выявление апоптотических фолликулов на криосрезах яичников

Идентификацию фолликулов с большим количеством апоптотических клеток в яичниках проводили после окрашивания криосрезом хроматиновым красителем DAPI и кроличьими моноклональными антителами к активной форме каспазы -3.

Каспаза -3 — фермент, индуцируемый прогестероном, является компонентом проведения сигнала рецепторной системы Fas/FasL, которой отводится роль в реализации апоптоза, в частности в клетках ткани яичника. Согласно литературным данным в яичниках позвоночных апоптоз опосредуется именно каспазами, благодаря чему обеспечивается удаление избыточных или нежизнеспособных зародышевых и гранулезных клеток, при этом чрезмерность апоптоза и атрезия фолликулов могут отрицательно влиять на фертильность. Нарушения апоптоза вовлечены также в патогенез хронической ановуляции и овариальной дисфункции. Перспективной задачей научных исследований на сегодняшний день является изучение возможности медикаментозного влияния на апоптоз с целью коррекции патологических изменений в женской половой железе, а также возможности повышения положительных исходов программ ЭКО.

Таким образом, иммуногистохимическое окрашивание криосрезом яичников антителами к каспазе -3 является подходящей маркерной реакцией для выяснения возможного влияния исследуемых препаратов на выживаемость прогениторных клеток яичников.

В ходе эксперимента было проанализировано от 23 до 58 криосрезом яичников от каждого животного контрольного и опытных групп. Результаты подсчета количества апоптотических фолликулов представлены в табл. 3.

Результаты проведенных исследований показали, что количество апоптотических фолликулов достоверно больше у мышей, получавших исследуемые препараты в течение 1 месяца по сравнению с контролем. Увеличение количества апоптотических фолликулов может отражать атрезию «излишка» фолликулов, приступивших к созреванию в ответ на

применение предлагаемых препаратов , поскольку в организме млекопитающих , в том числе , человека и мыши , функционируют естественные механизмы , ограничивающие количество формирующихся зрелых яйцеклеток до физиологической нормы .

Таблица 3 - Количество апоптотических фолликулов

Группы	Номера мышей	Количество срезов	Количество фолликулов на срез, М±m
Препарат 1	1	44	1,68±0,19
	2	23	4,95±0,18
	3	37	4,07±0,29
	4	34	4,62±0,29
	5	41	1,95±0,13
Всего на группу:		179	3,52±0,14*#
Препарат 2	6	31	3,01±0,17
	7	49	2,87±0,16
	8	36	3,78±0,25
	9	35	4,77±0,32
	10	40	5,12±0,10
Всего на группу:		191	3,88±0,18*#
Препарат 3	11	48	5,23±0,25
	12	28	3,13±0,20
	13	41	4,91±0,32
	14	30	4,88±0,24
	15	39	3,46±0,15
Всего на группу:		186	4,39±0,24*#
Контроль	16	58	4,28±0,26
	17	52	3,65±0,31
	18	50	1,33±0,09
	19	41	2,85±0,22
	20	40	2,36±0,15
Всего на группу:		241	2,91±0,12
Примечание:			
* Отличия от группы контроля достоверны по t-критерию, p<0,001			
# Отличия достоверны по критерию Колмогорова-Смирнова, p<0,05			

При применении предлагаемых препаратов в дозе 0,4 мг/кг ежедневно в течение 4 недель , у самок мышей линии BALB/c LacY, характеризующихся низкой плодовитостью , связанной с высокой эмбриональной гибелью

потомства , предположительно , из-за плохого качества родительских гамет , в яичниках отмечается снижение количества ранних фолликулов (примордиальных и первичных) и увеличение числа фолликулов , претерпевающих атрезию (апоптических фолликулов).

Известно , что с каждым менструальным циклом общее количество фолликулов в яичнике уменьшается , и при их исчезновении наступает менопауза [Richardson S. et al. Follicular depletion during the menopausal transition: evidence for accelerated loss and ultimate exhaustion// Jour.Clin.Endocr.Metab. - 1987.- Vol. 65. - p. 1231 - 1237; Боярский К.Ю ., Гайдуков С.Н., Чинчаладзе А.С. Факторы , определяющие овариальный резерв женщины // Журнал акушерства и женских болезней . - 2009 - т.58 - №2 - стр . 65-71]. При этом , чем интенсивнее происходит фолликулогенез , тем быстрее истощается овариальный резерв (ОР), отражающий остаточное количество находящихся в яичниках фолликулов (примордиальный пул и растущие фолликулы) (Боярский и др., 2009). Поскольку скорость снижения количества примордиальных и первичных (ранних) фолликулов коррелирует с интенсивностью фолликулогенеза , наблюдаемое в данном эксперименте уменьшение их числа относительно контроля может свидетельствовать об усилении процессов образования фолликулов у животных , получавших предлагаемые препараты . В пользу данного утверждения свидетельствует и выявленное увеличение количества апоптических фолликулов , которое связано с известными , функционирующими в организме естественными механизмами , контролирующими число образующихся яйцеклеток [Боярский К.Ю ., Гайдуков С.Н. Молекулярные основы фолликулогенеза : от стадии больших антральных фолликулов до овуляции // Проблемы репродукции - 2010 - 5 - стр . 13-22; Зенкина В.Г. Значение апоптоза в яичниках при развитии некоторых заболеваний репродуктивной системы // Фундаментальные исследования N26, 2011. с.227-230]. Из большого числа активизирующихся примордиальных фолликулов , приступивших к дифференцировке , до овуляции доходит только небольшое количество

доминантных фолликулов , количество которых , как и , соответственно , число рождающихся впоследствии детёнышей , отличается у разных видов . Например , у человека обычно созревает по 1 яйцеклетке в каждом цикле , у других млекопитающих количество созревающих яйцеклеток больше (в среднем , около 4-8 яйцеклеток у мыши , около 6 - у кошек и т. д.). Остальные созревающие фолликулы , отстающие в развитии от доминантных , претерпевают атрезию — останавливаются в развитии на разных стадиях и гибнут путем апоптоза [Боярский К.Ю ., Гайдуков С.Н. Молекулярные основы фолликулогенеза : от стадии больших антральных фолликулов до овуляции // Проблемы репродукции - 2010 - 5 - стр. 13-22; Зенкина В.Г. Значение апоптоза в яичниках при развитии некоторых заболеваний репродуктивной системы // Фундаментальные исследования N26, 2011. с.227-230; Березовкая Е.П. Гормонотерапия в акушерстве и гинекологии : иллюзии и реальность // 2014]. Следовательно , чем больше фолликулов вступают на путь дифференцировки , тем больше их погибнет путем атрезии , при относительно неизменном количестве образующихся зрелых яйцеклеток . Таким образом , увеличение числа апоптических фолликулов в совокупности с общим снижением количества оставшихся ранних фолликулов , наблюдаемое на фоне применения предлагаемых препаратов , может отражать повышение интенсивности фолликулогенеза , связанное с увеличением количества фолликулов , вышедших из состояния покоя и приступивших к созреванию . В этой ситуации , реализация естественных процессов в организме , контролирующая количество образующихся зрелых яйцеклеток , функционирует как фактор их естественного отбора , и образования , впоследствии , наиболее здорового потомства .

Пример 2. Целью данного исследования была оценка влияния исследуемых препаратов на репродуктивную функцию мышей при их введении одному полу (самкам) .

Исследования проводили на 60 самцах и 120 самках мышей линии BALB/c LacY с исходной массой тела 20-25 г. Предлагаемые препараты в

виде суспензии с водой, приготовленной *ex tempore*, вводили самкам мышей опытных групп ежедневно интрагастрально в течение 2-х недель в дозе 0,4 мг на кг массы тела. Самок разделили на 4 подгруппы: контрольную (n=30) и 3 опытные группы по 30 особей (n=90). Самкам опытных групп ежедневно в течение 2-х недель (3-4 эстральных циклов) внутривенно вводили предлагаемые препараты, а самкам контрольной группы - β -циклодекстрин 0,4 мг на кг массы тела. Группа самцов, состоящая из 60 животных в течение 6 недель (2-3 цикла созревания сперматозоидов) получали соответствующее количество β -циклодекстрина. Исследуемые препараты вводили в 10 часов 1 раз в сутки. После введения изучаемых препаратов формировали следующие группы животных:

- Группа А: К 15 контрольным самцам были подсажены 30 контрольных самок (Контроль);
- Группа Б: К 15 контрольным самцам были подсажены 30 опытных самок (Препарат 1);
- Группа В: К 15 контрольным самцам были подсажены 30 опытных самок (Препарат 2);
- Группа Г: К 15 контрольным самцам были подсажены 30 опытных самок (Препарат 3).

Во всех исследуемых группах самок в течение двух эстральных циклов просматривали вагинальные мазки, отмечали стадии проэструс, эструс и диэструс. Обнаружение в вагинальных мазках сперматозоидов считали первым днем наступления беременности. По истечению 10 суток из самок в каждой из четырех групп формировали по две подгруппы (А 1 и А 2, Б 1 и Б 2, В 1 и В 2, Г 1 и Г 2). В каждой группе первые подгруппы самок (А 1, Б 1, В 1 и Г 1) вскрывали на 20 день беременности, подсчитывали число плодов, резорбций, мест имплантаций в полости матки, желтых тел в яичниках. На основании полученных данных по нижеуказанным формулам рассчитывали показатели предимплантационной и постимплантационной гибели и индексов плодовитости и беременности.

$$\text{Индекс плодовитости} = \frac{\text{кол - во оплодотворенных самок}}{\text{кол - во ссаженных самок}} \cdot 100\%$$

$$\text{Индекс беременности} = \frac{\text{кол - во беременных самок}}{\text{кол - во оплодотворенных самок}} \cdot 100\%$$

$$\text{Предимплантационная гибель} = \frac{\text{число желтых тел} - \text{число мест имплантации}}{\text{число желтых тел}} \cdot 100\%$$

$$\text{Постимплантационная гибель} = \frac{\text{число мест имплантации} - \text{число живых плодов}}{\text{число мест имплантации}} \cdot 100\%$$

При осмотре плодов регистрировали патологические изменения (подкожные кровоизлияния и отек подкожной клетчатки, нарушения развития скелета, глазных яблок).

Вторые подгруппы беременных самок оставляли на роды, фиксировали дату родов, количество мышат в помете, массу тела новорожденных мышат. На 21 день со дня родов вычисляли процент выживаемости, отмечали общий и средний вес мышат, оценивали показатель постнатальной смертности.

$$\text{Постнатальная смертность} = \frac{\text{число мышей в помете через 3 недели}}{\text{число новорожденных в помете}} \cdot 100\%$$

Для статистической обработки данных использовали стандартные методы, приведённые в руководстве В.Ю. Урбаха «Биометрические методы» и пакетах программ Excel 2003 и SigmaStat 3.0.

Результаты исследований влияния предлагаемых препаратов на плодовитость мышей линии BALB/c LacY свидетельствуют о том, что эти животные в контроле имеют низкую плодовитость и только у 50 % оплодотворённых самок наступает беременность (табл. 4, гр. А). Повышение индекса беременности до 67,9 % наблюдалось в группах, в которых самки принимали исследуемые препараты (группы Б, В и Г).

Таблица 4 - Влияние изучаемых препаратов на показатели плодовитости мышей -самок линии BALB/c LacY

Исследуемые показатели	Группы мышей -самок
------------------------	---------------------

	А	Б	В	Г
Число ссаженных самок в группе	30	30	30	30
Число оплодотворенных самок в группе	24	25	26	28
Индекс плодовитости , %	80	83	87	93
Число беременных самок в группе	12	15	16	19
Индекс беременности , %	50,0	60,0	61,5	67,9

В таблице 5 приведены данные , полученные при анализе вскрытых на 20-й день беременности самок , по следующим показателям репродуктивной функции : количество желтых тел , мест имплантации и живых плодов . Эти данные позволяют рассчитать по приведенным выше формулам предимплантационную и постимплантационную типы гибели зародышей мышей контрольной и опытных групп .

Полученные результаты (табл . 5) показали , что введение предлагаемых препаратов самкам (группы Б 1, В 1 и Г 1) снижает предимплантационную и постимплантационную гибель зародышей .

Таблица 5 - Влияние предлагаемых препаратов на репродуктивную функцию мышей -самок линии BALB/c LacY, вскрытых на 20-й день беременности

Исследуемые показатели	Группы мышей-самок			
	А1	Б1	В1	Г1
Число анализируемых самок	12	12	13	14
Число беременных самок	6	7	8	9
Число желтых тел	28	36	39	42
Число мест имплантации	17	29	33	36
Число живых плодов	11	24	28	32
Число погибших плодов	6	5	5	4
Предимплантационная гибель, %	39,3	19,4	17,9	14,3
Постимплантационная гибель, %	35,3	17,2	15,2	11,1

Приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют о том , что введение мышам -самкам предлагаемых препаратов увеличивает по сравнению с контролем число и процент рожающих самок (табл . 6, группы Б2, В 2 и Г 2).

Увеличение числа рожающих самок соответствует увеличению числа пометов, что повышает общую численность мышат в анализируемых группах. Исследование постнатального развития родившегося потомства мышей линии BALB/c LacY показало, что введение самкам (табл. 7, группы Б2, В2 и Г2) предлагаемых препаратов увеличивает по сравнению с контролем общее число новорожденных мышат, из которых от 85,2 % до 90,0 % доживают до 3-х недельного возраста.

Таблица 6 - Влияние предлагаемых препаратов на показатели родовой активности мышей -самок линии BALB/c LacY

Исследуемые показатели	Группы мышей-самок			
	А2	Б2	В2	Г2
Число самок в группах	12	13	13	14
Число оплодотворенных самок в группах	12	13	13	14
Число и процент оплодотворенных самок, принесших потомство	6 (50,0 %)	8 (61,5 %)	8 (61,5 %)	10 (71,4 %)

Таблица 7 - Влияние предлагаемых препаратов на показатели постнатального развития мышат линии BALB/c LacY

Исследуемые показатели	Группы животных			
	А2	Б2	В2	Г2
Общее число мышат, рожденных самками в анализируемых группах	36	54	55	70
Среднее число новорожденных мышат в помете	6,0±0,30	6,8±0,24*	6,9±0,26*	7,0±0,33*
Средняя масса новорожденных мышонка в помете, г	0,98±0,10	1,26±0,13*	1,35±0,15*	1,47±0,19*
Число и процент мышат, доживших до 3-х недельного возраста	26 (72,2%)	46 (85,2%)	48 (87,3%)	63 (90,0%)
Средняя масса одного мышонка через 3 недели после рождения, г	10,3±0,35	12,1±0,47*	12,8±0,65*	13,2±0,98*

*Отличия от группы контроля достоверны по t-критерию, $p < 0,05$

Также была проведена оценка изменения массы тела новорожденных мышат, родившихся от самок, которым вводили предлагаемые препараты. Полученные результаты показали, что по росту и развитию новорожденные мышата, рожденные от самок опытных групп (табл. 7, группы Б2, В2 и Г2) достоверно опережали своих сверстников из контроля (табл. 7, группа А2).

Проведенные нами исследования показали, что у мышей линии BALB/c LacY имеются некоторые нарушения репродуктивной функции, связанные с деторождением беременных самок и рождением жизнеспособного потомства.

Для повышения репродуктивной способности женских особей предлагаются препараты, представляющие собой 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен, его смесь и клатратный комплекс с β -циклодекстрином, которые обеспечивают стимулирование детородной функции, плодовитости самок и жизнеспособности рожденного потомства.

Следует отметить, что в Примерах 1 и 2 Препарат 2, представляющий смесь соединения 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен с β -циклодекстрином исследовался в соотношении 2 мг к 188 мг β -циклодекстрина, соответственно. При этом соотношении 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена с β -циклодекстрином отмечено стимулирование детородной функции, плодовитости самок и жизнеспособности рожденного потомства. Аналогичные результаты были получены при введении мышам-самкам Препарата 2 в других предложенных соотношениях.

Применение предлагаемых препаратов в дозе 0,4 мг/кг ежедневно в течение 4 недель, у самок мышей линии BALB/c LacY, приводит к увеличению количества апоптических фолликулов (атрезию) в совокупности с уменьшением остаточного количества ранних фолликулов. Полученные результаты Примера 1 согласуются с результатами, приведенными в Примере 2, об общем положительном влиянии предлагаемых препаратов на репродуктивные показатели самок и качество полученного потомства, и свидетельствуют о более высокой интенсивности фолликулогенеза у животных, получающих изучаемые вещества. При этом предлагаемые

препараты не нарушают естественные процессы в организме , контролирующие количество образующихся зрелых яйцеклеток . В данной ситуации , при большем числе фолликулов , вступивших на путь дифференцировки , большее их количество претерпевают атрезию при относительно неизменном числе образующихся зрелых яйцеклеток . Этот комплекс естественных физиологических процессов предполагает , что в оогенезе образуется пул жизнеспособных яйцеклеток , при оплодотворении которых формируется здоровое потомство .

Таким образом , проведенные исследования позволяют сделать вывод о том , что предлагаемые препараты оказывают положительное влияние на репродуктивную функцию женских особей , в значительной мере связанное со стимулированием у них фолликулогенеза .

Предлагаемые препараты расширяют арсенал средств , предназначенных в гинекологии для лечения женского бесплодия за счет негормонального стимулирования фолликулогенеза .

Примеры твердых лекарственных форм включают , например , таблетки , пилюли , желатиновые капсулы и др .

Примеры жидких лекарственных форм для инъекций и парентерального введения включают растворы , эмульсии , суспензии и др . Композиции , как правило , получают с помощью стандартных процедур , предусматривающих смешение активного соединения с жидким или тонко измельченным твердым носителем .

Композиции согласно изобретению в форме таблеток содержат от 5 до 30 % активного соединения и наполнитель (и) или носитель (и). В качестве таковых для таблеток применяются : а) разбавители : свекловичный сахар , лактоза , глюкоза , натрия хлорид , сорбит , маннит , гликоль , фосфат кальция двузамещенный ; б) связующие вещества : магниевый силикат алюминия , крахмальная паста , желатин , трагакант , метилцеллюлоза , карбоксиметилцеллюлоза и поливинил пиррол и дон ; в) разрыхлители : декстроза , агар , альгиновая кислота или ее соли , крахмал , твин .

ПРИМЕР

1.

100 мг таблетки , содержащие по 2 мг 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантена

9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен	2 мг
Лактоза	53,0 мг
Альгиновая кислота	20,0 мг
Лимонная кислота	5,0 мг
Трагакант	20,0 мг

Таблетка может быть сформирована посредством прессовки или формовки активного ингредиента с одним или более дополнительными ингредиентами . Получение прессованных таблеток осуществляется на специальной установке . Активный ингредиент в свободной форме , такой , как порошок или гранулы , в количестве 20 г (количество вещества , необходимое для получения 10000 таблеток) перемешивается со связующим веществом - трагакантом (200 г), смешивается с разбавителем - лактозой (530 г), в смесь добавляется разрыхляющее вещество - альгиновая кислота (200 г) и отдушка - лимонная кислота (50 г).

Для желатиновых капсул обычно используются дополнительно красители и стабилизаторы . В качестве красителей применяются : тетразин , индиго ; в качестве стабилизаторов могут быть представлены : натрия метабисульфит , натрия бензоат . Предлагаемые желатиновые капсулы содержат от 1 до 20 % активного ингредиента .

ПРИМЕР .

1 капсула 5 мг содержит :

Активное вещество :

9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен - 5 мг в пересчете на безводное вещество

Вспомогательные вещества :

Бетадекс (β -цикло декстрин) до массы содержащего 190 мг

Капсулы твердые желатиновые :

Желатин

Титана диоксид (E 171)

Активный ингредиент в свободной форме, такой, как порошок или гранулы, в количестве 50 г (количество вещества, необходимое для получения 10000 таблеток) перемешивается с веществом бетадекс (1850 г).

Инъекционные формы композиции предпочтительно представляют собой изотонические и масляные растворы, суспензии. Вышеуказанные формы могут стерилизоваться и содержать добавки, такие как консерванты: натрия метабисульфит, бензойная кислота, натрия бензоат, смесь метилпарабена и пропилпарабена; стабилизаторы: абрикосовая и аравийская камедь, декстрин, крахмальный клейстер, метилцеллюлоза, твин; соли, регулирующие осмотическое давление (хлорид натрия), или буферы. Кроме того, они могут содержать другие терапевтически полезные вещества.

ПРИМЕР .

2 мл ампулы, содержащие по 1 мг 9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена

9-фенил-симм-октагидроселено-ксантен 1,0 мг

Соевое масло гидрированное 2 мл

Для приготовления инъекционных форм активного соединения (1 г; количество, необходимое для изготовления 1000 ампул) тонко измельчают и смешивают в смесителе с соевым маслом гидрированным (2000 мл). Полученный раствор фасуют в ампулы по 2 мл и стерилизуют паром в течение 30 мин.

Назначаемая для приема доза активного компонента (9-фенил-симм-октагидроселено-ксантена формулы 1 или его смеси с β -циклодекстрином или клатратного комплекса с β -циклодекстрином) варьирует в зависимости от многих факторов, таких как возраст, пол, масса тела пациента, симптомы и тяжесть заболевания, конкретно назначаемое соединение, способ приема, форма препарата, в виде которой назначается активное соединение. Обычно, общая назначаемая доза составляет от 0,5 до 20 мг в день. Общая доза может быть разделена на несколько доз, например, для приема от 1 до 4

раз в день . При оральном назначении интервал общих доз активного вещества составляет от 0,5 до 20 мг в день , предпочтительно , от 1 до 10 мг . При парентеральном приеме интервал назначаемых доз составляет от 0,1 до 5 мг в день , предпочтительно , от 0,5 до 2 мг . Эффективная терапевтическая доза препарата может быть выбрана лечащим врачом .

Формула изобретения

1. Применение 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантена в качестве средства для лечения женского бесплодия , стимулирующего фолликулогенез и способствующего имплантации эмбрионов в эндометрий матки .
2. Лекарственный препарат для лечения женского бесплодия , отличающийся тем , что в качестве активного компонента содержит 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен в эффективном количестве .
3. Лекарственный препарат по п.2, отличающийся тем , что дополнительно содержит β -цикло декстрин в соотношениях от 1:1 - до 1:10.
4. Лекарственный препарат по п.2, отличающийся тем , что активный компонент 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен представлен в виде клатратного комплекса с β -цикло декстрином .
5. Фармацевтическая композиция для лечения женского бесплодия , отличающаяся тем , что в качестве активного компонента содержит 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен .
6. Фармацевтическая композиция по п.5, отличающаяся тем , что содержит 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен в виде клатратного комплекса с β -цикло декстрином .
7. Фармацевтическая композиция по п.5 или 6, отличающаяся тем , что применяется в форме таблеток .
8. Фармацевтическая композиция по п.7, отличающаяся тем , что содержит :
 - 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен от 5 до 30% ;
 - один или более наполнитель (и) или носитель (и) остальное .
9. Фармацевтическая композиция по п.8, отличающаяся тем , что таблетка сформирована посредством прессовки или формовки 9-

фенил -симм -октагидроселено -ксантена с одним или более дополнительными ингредиентами .

10. Фармацевтическая композиция по п.5 или б, отличающаяся тем, что она применяется в форме желатиновых капсул .


11. Фармацевтическая композиция по п.10, отличающаяся тем, что содержит :

- 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен от 1 до 20%;
- наполнитель (и) или носитель (и) остальное .


12. Фармацевтическая композиция по п.5 или б, отличающаяся тем, что выполнена в виде растворов , эмульсий , суспензий и др .

13. Фармацевтическая композиция по п.12, отличающаяся тем, что содержит :

- 9-фенил -симм -октагидроселено -ксантен от 0,25 до 2% ;
- наполнитель (и) или носитель (и) остальное .



Фиг 1. Первичный фолликул. Иммуногистохимическое окрашивание антителами к белку ядрышка фибрилларину (зеленый). Два ядрышка указаны стрелками.



Фиг 2. Первичный фолликул. Иммуногистохимическое окрашивание красителем на хроматин DAPI (голубой).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/RU 2018/050068

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER see the supplemental sheet According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61 K 9/10, 9/107, 9/20, 9/48, 9/08, 31/095, 47/00, 47/40, 47/69, A61 P 15/08 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) PatSearch (RUPTO internal), Esp@cenet, PAJ, USPTO, Information Retrieval System of FIPS		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	RU 2451680 C 1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU "NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKAYA KOM PANIYA "MEDBIOFARM") 27.05.2012, claims 1-6, 11-16, p. 6, line 51 - p. 7, line 14, p. 10, line 51 - p. 11, line 34	2-13
X	RU 2281007 C2 (BORIAEV GENNADII IVANOVICH et al.) 10.08.2006, the claims, example 10	2, 5
X	RU 2414215 C 1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU "NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA KOM PANIYA "MEDBIOFARM") 20.03.2011, the claims	2, 5
A	RU 231 7074 C 1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU "MBF") 20.02.2008, the claims, abstract	1-13
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. D See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 13 November 2018 (07.11.2018)		Date of mailing of the international search report 29 November 2018 (29.11.2018)
Name and mailing address of the ISA/ Facsimile No.		Authorized officer Telephone No.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 9/10 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 47/69 (2017.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)

<p>А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ (см. дополнительный лист)</p> <p>Согласно Международной патентной классификации МПК</p>																
<p>В. ОБЛАСТЬ ПОИСКА</p> <p>Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации)</p> <p style="text-align: center;">А 6 I К 9/10, 9/107, 9/20, 9/48, 9/08, 31/095, 47/00, 47/40, 47/69, А 6 I P 15/08</p> <p>Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки</p> <p>Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)</p> <p style="text-align: center;">PatSearch (RUPTO internal), Esp@cenet, PAJ, USPTO, Information Retrieval System of FIPS</p>																
<p>С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория *</th> <th>Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей</th> <th>Относится к пункту №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>RU 2451680 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 27.05.2012, п.п. 1-6, 11-16 формулы, с. 6, строка 51 - с. 7, строка 14, с. 10, строка 51 - с. 11, строка 34</td> <td>2-13</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>RU 2281007 C 2 (БОРЯЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ и др.) 10.08.2006, формула, пример 10</td> <td>2, 5</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>RU 2414215 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 20.03.2011, формула</td> <td>2, 5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>RU 2317074 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБФ ") 20.02.2008, формула, реферат</td> <td>1-13</td> </tr> </tbody> </table>		Категория *	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №	X	RU 2451680 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 27.05.2012, п.п. 1-6, 11-16 формулы, с. 6, строка 51 - с. 7, строка 14, с. 10, строка 51 - с. 11, строка 34	2-13	X	RU 2281007 C 2 (БОРЯЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ и др.) 10.08.2006, формула, пример 10	2, 5	X	RU 2414215 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 20.03.2011, формула	2, 5	A	RU 2317074 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБФ ") 20.02.2008, формула, реферат	1-13
Категория *	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №														
X	RU 2451680 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 27.05.2012, п.п. 1-6, 11-16 формулы, с. 6, строка 51 - с. 7, строка 14, с. 10, строка 51 - с. 11, строка 34	2-13														
X	RU 2281007 C 2 (БОРЯЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ и др.) 10.08.2006, формула, пример 10	2, 5														
X	RU 2414215 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕДБИОФАРМ ") 20.03.2011, формула	2, 5														
A	RU 2317074 C 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБФ ") 20.02.2008, формула, реферат	1-13														
<p><input type="checkbox"/> последующие документы указаны в продолжении графы С. <input checked="" type="checkbox"/> данные о патентах -аналогах указаны в приложении</p>																
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>* Особые категории ссылающихся документов:</p> <p>"А" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>"Е" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>"L" документ, подвергающий сомнению притязание (я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылающегося документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>"O" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>"P" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>"I" более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>"X" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>"Y" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>"&" документ, являющийся патентом -аналогом</p> </td> </tr> </table>		<p>* Особые категории ссылающихся документов:</p> <p>"А" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>"Е" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>"L" документ, подвергающий сомнению притязание (я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылающегося документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>"O" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>"P" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p>	<p>"I" более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>"X" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>"Y" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>"&" документ, являющийся патентом -аналогом</p>													
<p>* Особые категории ссылающихся документов:</p> <p>"А" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>"Е" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>"L" документ, подвергающий сомнению притязание (я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылающегося документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>"O" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>"P" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p>	<p>"I" более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>"X" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>"Y" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>"&" документ, являющийся патентом -аналогом</p>															
<p>Дата действительного завершения международного поиска</p> <p style="text-align: center;">07 ноября 2018 (07.11.2018)</p>	<p>Дата отправки настоящего отчета о международном поиске</p> <p style="text-align: center;">29 ноября 2018 (29.11.2018)</p>															
<p>Наименование и адрес ISA/RU: Федеральный институт промышленной собственности, Бережковская наб., 30-1, Москва, Г-59, ГСП -3, Россия, 125993 Факс : (8^95) 531-63-18, (8-499) 243-33-37</p>	<p>Уполномоченное лицо :</p> <p style="text-align: right;">Н. Лилинчук</p> <p>Телефон № (495)531-64-81</p>															

A 61K 9/10 (2006.01)
A 61K 9/107 (2006.01)
A 61K 9/20 (2006.01)
A 61K 9/48 (2006.01)
A 61K 9/08 (2006.01)
A 61K 31/095 (2006.01)
A 61K 47/69 (2017.01)
A 61K 47/40 (2006.01)
A 61P 15/08 (2006.01)